



Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano

Dra. Rosvani M. Morales Irecta

Los casos de la vida

Crecimiento y desarrollo


PASIÓN POR EDUCAR

3°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de diciembre de 2023.

PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO



Definición

Es cuando la conexión de la arteria pulmonar y la aorta no se cierra, permitiendo que algo de sangre oxigenada al cuerpo retorne a los pulmones

Factores de riesgo

- Nacimiento prematuro
- Antecedentes familiares
- Rubéola durante el embarazo
- sexo femenino



Clínica

Presión arterial baja
A menudo asintomático
Respiración rápida o dificultosa

Diagnóstico


Ecocardiografía



Tratamiento

Fármacos
Cirugía

Comunicación interauricular




Definición

Es una solución de continuidad en el tabique interauricular que causa un cortocircuito izquierdo-derecho y sobrecarga de volumen de la aurícula derecha y el ventrículo derecho

factores de riesgo

- Sarampión (rubéola) en los primeros meses del embarazo
- Diabetes
- Lupus
- Consumo de alcohol o tabaco




Tipos

secundum
primum
seno venoso
seno coronario

Síntomas

Asintomático



Diagnóstico

Ecocardiografía
Radiografía de tórax y ECG

Auscultación

Tratamiento


Observación, cierre transcater o reparación quirúrgica



COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR

Definición

Es una solución de continuidad en el tabique interventricular que causa un cortocircuito entre los ventrículos



Factores de riesgo

Nacimiento prematuro. Síndrome de Down y otras afecciones genéticas.

Síntomas

Asintomático



Diagnóstico

Ecocardiografía Radiografía de tórax y ECG Auscultación

Tratamiento

En caso de insuficiencia cardíaca, tx medico Quirurgico



SINDROME DE ASPIRACIÓN DE MECONIO

Definición

Se produce cuando el sobreesfuerzo obliga al feto a tomar bocanadas de aire de manera que inhala el líquido amniótico que contiene meconio y este se deposita en los pulmones.



Factores de riesgo

un parto difícil
Edad gestacional avanzada (o post maduridad)
Una madre que fuma mucho o que padece diabetes o hipertensión

Síntomas

Dificultad respiratoria
Cianosis
Presión arterial baja



Diagnóstico

Meconio en el líquido amniótico
Dificultad respiratoria
Radiografía de tórax

Tratamiento

Succión de las vías respiratorias
Medidas para apoyar la respiración
Surfactantes o antibióticos
artificial



TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO

Definición

Es una respiración temporalmente rápida y algunas veces fatigosa que se presenta a menudo con concentraciones bajas de O₂ en sangre debidas al exceso de líquidos en los pulmones después del nacimiento



Síntomas

Dificultad respiratoria
Cianosis
Taquipnea

Factores de riesgo

El parto por cesárea y la prematuridad moderada-tardía



Diagnóstico

Dificultad respiratoria y frecuencia respiratoria
Radiografía de tórax
Análisis de sangre y hemocultivo

Tratamiento


Oxígeno



ENTEROCOLITIS NECROSANTE

Definición

Enfermedad grave, se produce cuando el tejido del intestino grueso se inflama; esta inflamación daña y en ocasiones mata el tejido del colón de su bebe.



Síntomas

Distensión abdominal
La comida no se mueve por los intestinos

Factores de riesgo

Nacimiento prematuro
Alimentación con fórmula
Nacimiento difícil o bajos niveles de O2 en el nacimiento
Demasiados glóbulos rojos
Infección en el intestino



Diagnóstico

Radiografía abdominal

Tratamiento

Detener la alimentación
Sonda nasogastrica
Hidratación y alimentación IV
Antibióticos
Aislamiento



<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001148.htm>

Bibliografía

Bibliografía en cada flash card 😊