



Claudia Patricia Abarca Jiménez

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

La vida antes y después


Crecimiento y desarrollo

3°

“B”

FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO BIBLIOGRAFIA

Salud, S. d (2013). manual complementario infantil. En desarrollo para la aplicación de la prueba evaluación del desarrollo infantil "EDI"
factores de riesgo biológicos
37, 39.




PERIODO DE DESARROLLO

Alumna Patricia Abarca Jiménez

BIBLIOGRAFIA

Thonson, a. (2019). introducción
al desarrollo infantil. En desarrollo
y crecimiento en la
niñez.



Citomegalovirus

Herpes Simple

TORCH

Rubéola

Toxoplasmosis

Otras

Bibliografías:

- "Infección neonatal por virus Herpes Simple (HSV)". Manual MSD, 13 July 2020.
- Tesini, Brenda L. "Infección congénita y perinatal por citomegalovirus (CMV)". Manual MSD, 13 July 2020.

Toxoplasmosis congénita: Medline plus Enciclopedia Médica

Tensi, Brenda L. "Rubéola congénita". Manual MSD 5 July 2022.

R^{1/2} Te faltan las enfermedades de la letra "O" de TORCH

OTRAS



Sifilis

Características =

- 1) Treponema pallidum
- 2) Espiroqueta
- 3) Plano y ondulada

Diagnóstico

- Radiografía de hueso
- Examen de campo oscuro
- Examen de los ojos

Clinica =

- 1) Deformación en hueso
- 2) Anemia grave
- 3) Ictericia
- 4) Meningitis
- 5) ↑ vol. en bazo.

Tratamiento =

- Penicilina
- Gotas corticosteroides
- Atropinas

Zika

Característica

- Flavivirus
- Transmitido por vector
- + asintomáticos

Dx =

- Serologías
- PCR

Clinica

- Fiebre
- Erupción cutánea
- Dolor articular
- Conjuntivitis

Tx =

No hay tx antiviral

↓
Cuidados

- Reposo
- Hidratación
- Paracetamol

NOM-007-
SSA-2016.

Consulta preconcepcional.

- Se debe fomentar para promover la salud
- Ayuda a identificar condiciones que pongan en riesgo en el embarazo y llevar medidas.

¿En qué tiempo se debe hacer la consulta prenatal?

- 1ª → 6-8 semanas
- 2ª → 10-13.6 semanas
- 3ª → 16-18 semanas
- 4ª → 22 semanas
- 5ª → 28 semanas
- 6ª → 32 semanas
- 7ª → 36 semanas
- 8ª → 38-41 semanas

Consultas prenatales

- Detecta riesgos fetales y maternos
- Ultrasonido medio fundamental de vigilancia
- Aplicar tamiz

1	-11-13.6
2	-16-22

Atención del recién nacido

- Consulta en el momento de nacer
- Consulta de revisión entre 3-5 días después
- Consulta posterior a 28 días de nacer

• Reanimación neonatal
(si es necesario)

• Uso de vitamina K
1 mg.

• Valorar: → apgar
→ Silverman

• Manejo cordón umbilical



• Examen físico y antropométrico

• Prevención oftálmica.

TAMIZ NEONATAL

¿Qué es?

Prueba de talón o
Cordón umbilical.




Cordón umbilical

¿Cuándo se
realiza?

A partir de las
72 horas de
nacimiento
hasta los 5
días

¿Para que se
realiza?


Para el tra
oportuno
hipotiroidis
conge



Hipotiroidismo congénito (TSH)

Hipotiroidismo primario

Insuficiencia para la
Síntesis de hormona
tiroidea.



Hipotiroidismo secundario

Deficiencia a nivel
hipofisario

Hipotiroidismo terciario

Deficiencia de estimulación
por TSH por
problema hipotalámico.

Tx =

Levo-tiroxina
Sódica

Dosis ↓

10-15 g/kilo
de peso/día

Hiperplasia Suprarrenal Congénita.

Definición = Alteración genética provocada por la falta de enzimas que produce la glándula suprarrenal.

¿Qué enzima?

Tipos

Clásica

- ↓ frecuente
- + grave
- Se presenta en nacimiento o primera infancia

No clásica

- + leve
- + común
- Se presenta en infancia o adultez

Clinica

- Cantidad insuficiente de cortisol
- Crisis suprarrenal
- Genitales atípicos
- Exceso andrógeno
- Alteración del crecimiento

Galactosemia

• Galactosa en Sangre

• Condición hereditaria

• La galactosa no se vuelve glucosa.

• Causa 3 Síndromes

Deficiencia de galactosa-1-fosfato uridil transferasa

- Anorexia
- ictericia
- Vomitos
- hepatomegalia
- Diarrea.

Deficiencia de galactosemia

Cataratas por producción de galactitol.

Deficiencia de uridina difosfato galactosa 4-epimerasa

No provoca clínica.

Tx = Restricción de galactosa

FENILCETONURIA

- ↑ de un aminoácido denominado fenilalanina
- Se produce por un cambio de gen de la fenilalanina hidroxilasa
- Se debe evitar alimentos con proteínas
- Transmitido por herencia

Consecuencias

- Daño cerebral irreversible
- Convulsiones
- Problemas de desarrollo
- Hiperactividad extrema

DATO IMPORTANTE =
Olor similar al
ratón en orina
y sudor

BIBLIOGRÁFIAS

1. Jhonson, a. (2019). *Introducción al desarrollo infantil. En desarrollo y crecimiento en la niñez*
2. Salud, S.D. (2013). *Manual complementario infantil. En desarrollo para la aplicación de la prueba evaluación del desarrollo infantil EDI. Factores de riesgo*
3. *Infección neonatal por virus herpes simple, (HSV). Manual MSD, 13 de July 2020*
4. Tesini, Brenda. *L infección congénita y perinatal por citomegalovirus (CMD)*
 5. *Toxoplasmosis congénita: Mediline plus Enciclopedia médica*
6. Tenisi, Brenda L. *Rubéola congénita. Manual MSD 5 de July 2022*
7. "DOF - Diario Oficial de La Federación." *Dof.gob.mx*, 2016,

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016#gsc.tab=0