




**Presenta: Daniel Martín Greene Díaz**

**Grado 3 grupo "B"**

**Flascards**

**Docente: Rosvani Margine Morales Irecta**





# Persistencia del conducto arterioso

Es cuando la conexión de la arteria pulmonar y la aorta no se cierra, permitiendo que algo de sangre oxigenada al cuerpo retorne a los pulmones

Síntomas:

- A menudo asintomático
- Respiración rápida o dificultosa
- Presión arterial baja


Dx.:

- Ecocardiografía

Tx.:

- Fármacos
- Cirugía

# Comunicación interauricular



Es una solución de continuidad en el tabique interauricular que causa un cortocircuito izquierdo-derecho y sobrecarga de volumen de la aurícula derecha y el ventrículo derecho

Síntomas:

- asintomático

Dx.:

- Ecocardiografía
- Radiografía de tórax y ECG
- Auscultación

Tx.:

- Observación, cierre transcater o reparación quirúrgica

# Comunicación interventricular

Es una solución de continuidad en el tabique interventricular que causa un cortocircuito entre los ventrículos

Síntomas:

- Asintomático

Dx.:

- Ecocardiografía
- Radiografía de tórax y ECG
- Auscultación

Tx.:

- En caso de insuficiencia cardiaca, tx meico
- Quirurgico



# Síndrome de aspiración de meconio

Se produce cuando el sobreesfuerzo obliga al feto a tomar bocanadas de aire de manera que inhala el líquido amniótico que contiene meconio y este se deposita en los pulmones.

## Síntomas:


- Dificultad respiratoria
- Cianosis
- Presión arterial baja

## Dx.:


- Meconio en el líquido amniótico
- Dificultad respiratoria
- Radiografía de tórax

## Tx.:

- Succión de las vías respiratorias
- Medidas para apoyar la respiración
- Surfactantes o antibióticos
- Ventilador artificial



# Taquipnea transitoria del recién nacido



Es una respiración temporalmente rápida y algunas veces fatigosa que se presenta a menudo con concentraciones bajas de O<sub>2</sub> en sangre debidas al exceso de líquidos en los pulmones después del nacimiento

## Síntomas:

- Dificultad respiratoria
- Cianosis
- Taquipnea

## Dx.:

- Dificultad respiratoria y frecuencia respiratoria
- Radiografía de tórax
- Analisis de sangre y hemocultivo

## Tx.:

- Oxígeno

# Enterocolitis necrosante

Enfermedad grave, se produce cuando el tejido del intestino grueso se inflama; esta inflamación daña y en ocasiones mata el tejido del colón de su bebe.



## Síntomas:

- distensión abdominal
- La comida no se mueve por los intestinos
- Líquido verdosa en el intestino
- Evacuación de los intestinos con sangre

## Dx.:

- Radiografía abdominal

## Tx.:

- Detener la alimentación
- Sonda nasogástrica
- Hidratación y alimentación IV
- Antibióticos
- aislamiento

## Síntomas:

- Nacimiento prematuro
- Alimentación con formula
- Nacimiento difícil o bajos niveles de O<sub>2</sub> en el nacimiento
- Demasiados glóbulos rojos
- Infección en el intestino