



**Nombre del alumno: Leslie Dennis
Cabrera Sanchez**

**Nombre del profesor: Rosvani
Margine Morales Irecta**

Actividad: Infografía

Materia: Crecimiento y desarrollo

Grado: 3

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de diciembre de 2023

TAQUIPNEA TRANSITORIA

DEFINICIÓN



CONSISTE EN DIFICULTAD RESPIRATORIA TRANSITORIA CAUSADA POR REABSORCIÓN DIFERIDA DE LÍQUIDO PULMONAR FETAL

EPIDEMIOLOGIA

LA PREVALENCIA EN MEXICO ES DE 10 A 20 X 1000 NACIMIENTOS

EN MÉXICO SE CALCULAN 24,000 A 48,000 CASOS POR AÑO, MAYOR MANTENIMIENTO NACIDOS POR CESAREA Y EN EL SEXO MASCULINO



CLASIFICACIÓN

PULMONAR O EXTRAPULMONAR

CLINICA

LOS SÍNTOMAS INCLUYEN TAQUIPNEA, RETRACCIÓN INTERCOSTAL Y SUBCOSTAL, QUEJIDO, ALETEO NASAL Y POSIBLE CIANOSIS.

FACTORES DE RIESGO

- NACIERON ANTES DE LAS 38 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACIÓN (PREMATURO O ANTES DE TÉRMINO).
- NACIERON POR CESÁREA
- ESPECIALMENTE SI EL TRABAJO DE PARTO TODAVÍA NO HA COMENZADO.
- NACIERON DE UNA MADRE CON DIABETES O ASMA.
- GEMELOS

DIAGNOSTICO

- ·RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
- ·HEMOGRAMA COMPLETO Y HEMOCULTIVOS

TRATAMIENTO

- OXÍGENO
- CON FRECUENCIA PUEDEN REQUERIR PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CPAP)
- INCLUSO VENTILACIÓN MECÁNICA.

Bibliografía

UNAM, F. (s.f.). *Guía de practica clínica*.

INTEGRANTES:

LESLIE DENNIS CABRERA SANCHEZ

NAHARA AGELETH FIGUEROA CABALLERO

ESMERALDA JIMENEZ JIMENEZ

MAYRA MOLLINEDO NOYOLA

PABLO ADOLFO

