



**Adriana Itzel Gallegos Gómez.**

**Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez.**

**Cuadro comparativo.**

**Sexualidad Humana.**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**3er semestre.**

**“B”.**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023.

# DESARROLLO FETAL

TRIMESTRE	SEMANA	DESCRIPCIÓN
1er trimestre	3era SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>El embrión <b>parece</b> de un pequeño trozo de carne.</li> <li><b>Mide</b> cerca de 0.2 cm</li> </ul>
	3era y 4ta SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>La <b>cabeza</b> se desarrolla de manera considerable.</li> <li>Se comienza a <b>formar</b> el SNC.</li> <li>Se pueden <b>observar</b> los inicios de ojos y orejas.</li> <li>Se <b>construye</b> la columna vertebral (finales de la 4ta SDG).</li> </ul>
	4ta-8va SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se <b>desarrollan</b> las partes corporales externas: <b>ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies.</b></li> </ul>
	Finales de la 7ma SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha <b>formado</b> el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino.</li> <li>Se han <b>formado</b> las gónadas, pero el género del feto no se distingue.</li> </ul>
	Final de la 10ma SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>El embrión <b>tiene</b> un conjunto completo de dedos.</li> <li><b>Tiene</b> uñas.</li> </ul>
	Final de la 12va SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Final</b> del 1er trimestre.</li> <li>El feto es <b>indudablemente</b> humano.</li> <li><b>Mide</b> cerca de 10 cm.</li> <li><b>Pesa</b> aproximadamente 19 grs.</li> </ul>
2do trimestre	Final de la 14va SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se <b>pueden</b> detectar movimientos del feto.</li> </ul>
	18va SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mujer <b>siente</b> los movimientos.</li> <li>Se puede <b>detectar</b> el latido cardíaco del feto.</li> </ul>
	20 SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>El feto <b>abre</b> sus ojos por 1era vez.</li> </ul>
	24 SDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>El feto es <b>sensible</b> a la luz.</li> <li>El feto puede <b>escuchar</b> sonidos in útero.</li> </ul>
	Final del 2do trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>La <b>piel</b> del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.</li> </ul>

3er trimestre	Principios del 3er trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <b>forman</b> depósitos de grasa por debajo de la piel.</li> <li>• Se <b>pierde</b> el vello sedoso.</li> </ul>
	7mo mes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El feto <b>rota</b> dentro del útero.</li> <li>• Asume una <b>posición</b> de cabeza.</li> </ul>
	<b>Durante los últimos 2 meses el crecimiento es veloz.</b>	
	Final del 8vo mes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El feto <b>pesa</b> en promedio 2500 grs.</li> </ul>
	9no mes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El bebé en promedio a término <b>pesa</b> 3300 grs.</li> <li>• <b>Mide</b> 50 cm.</li> </ul>

# ETAPAS DEL EMBARAZO

TRIMESTRE	CAMBIOS	
	FÍSICOS	PSICOLÓGICOS
1er trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aumento</b> elevado en niveles hormonales (estrógeno y progesterona).</li> <li>• Las <b>mamas</b> se inflaman y hormiguean.</li> <li>• Los <b>pezones</b> y <b>areola</b> se amplían y oscurecen.</li> <li>• <b>Necesidad</b> de orinar con mayor frecuencia.</li> <li>• <b>Crecimiento</b> del útero.</li> <li>• Náuseas matutinas.</li> <li>• Vomito.</li> <li>• <b>Repulsión</b> hacia la comida o su olor.</li> <li>• <b>Aumento</b> de exudados vaginales.</li> <li>• El PH de la vagina cambia.</li> <li>• <b>Sentimientos</b> de fatiga y sueño.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Satisfacción</b> radiante.</li> <li>• <b>Época</b> de altas y bajas emocionales.</li> <li>• La <b>madre</b> pasa de estar muy feliz a la depresión y el llanto.</li> <li>• La actitud hacia el embarazo.</li> <li>• <b>Bajos ingresos</b> = depresión durante el embarazo.</li> <li>• <b>Disponibilidad</b> de apoyo social.</li> <li>• <b>Pareja presente</b> = menores probabilidades de depresión.</li> </ul>
2do trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Movimientos</b> del feto.</li> <li>• <b>Desaparece</b> la mayoría de los síntomas físicos (náuseas matutinas).</li> <li>• Estreñimiento.</li> <li>• <b>Sangrados</b> nasales.</li> <li>• <b>Edema</b> en cara, manos, muñecas, tobillos y pies.</li> <li>• Las <b>mamas</b> completan su desarrollo para el amamantamiento.</li> <li>• <b>19 SDG</b> = puede salir calostro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>mujer</b> está más consciente de su embarazo.</li> <li>• <b>Algunas mujeres</b> se sienten torpes y resentidas por su figura.</li> <li>• <b>Periodo</b> de calma y bienestar relativos.</li> <li>• - <b>probabilidad</b> de depresión si la mujer tiene pareja.</li> <li>• Si han tenido <b>embarazos anteriores</b> = hay más angustia.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sentimiento</b> de cuidado o interés materno.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>3er trimestre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>útero</b> es muy grande y duro (hace presión sobre otros órganos). <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ <b>Pulmones:</b> falta de respiración.</li> <li>✚ <b>Estómago:</b> indigestión.</li> <li>✚ <b>Corazón:</b> está bajo tensión.</li> </ul> </li> <li>• <b>Dificultad</b> para conciliar el sueño.</li> <li>• El <b>ombligo</b> se ve empujado hacia afuera.</li> <li>• <b>Disminución</b> de energía.</li> <li>• <b>Aumento</b> de peso.</li> <li>• Se <b>presentan</b> contracciones de Braxton-Hicks.</li> <li>• El <b>equilibrio</b> se encuentra ligeramente trastornado.</li> <li>• <b>2-4 semanas</b> antes del nacimiento, el bebé rota y la cabeza desciende a la pelvis (1er embarazo).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mujeres</b> con apoyo social = bienestar psicológico.</li> <li>• <b>Mayores</b> ingresos.</li> <li>• <b>Madres primerizas</b> = aumento en la inconformidad con su pareja.</li> <li>• <b>Mayor afecto</b> = menor nivel de ansiedad e insomnio.</li> </ul>

# SIGNOS

SIGNOS PROBABLES		SIGNOS PRESUNTIVOS	SIGNOS POSITIVOS	
PRUEBAS	TIEMPO			
1. Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de hCG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oscila entre los <b>15 días</b> desde la concepción.</li> </ul>			
2. Pruebas de laboratorio.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 - 2 semanas</b> después de la ausencia del ciclo menstrual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amenorrea.</li> <li><b>Sensibilidad</b> de las mamas.</li> <li>Náuseas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Latido</b> del corazón fetal.</li> <li><b>Movimiento</b> fetal activo.</li> <li><b>Detección</b> del esqueleto fetal por medio de un ultrasonido.</li> </ul>	
3. Pruebas de orina.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>7 días</b> después de la implantación.</li> </ul>			
4. Radioinmunoanálisis beta-hCG.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>7 días</b> después de la fertilización.</li> </ul>			
5. Pruebas caseras.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>First Response.</i></li> <li><i>Fact Plus.</i></li> <li><i>Answer.</i></li> <li><i>Clear Blue.</i></li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Esperar al menos <b>7 días.</b></li> </ul>

**Bibliografía.**

Shibley Hyde, J., & DeLamater, J. (9na edición). *Sexualidad Humana*. México:  
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA.