

**Diego Caballero Bonifaz**

**Mariana Catalina Domínguez  
Saucedo**

**Cuadros comparativos**

**Sexualidad Humana**

**3**

**B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Octubre de 2023

<p>Primer trimestre</p>	<p>-El desarrollo es mas notable que en los otros trimestres</p> <p>-La pequeña masa de células implantadas en el útero se convierte en un feto con la mayoría de sistemas de rasgos humanos reconocibles</p> <p><b>-2da SDG:</b> el embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2cm</p> <p><b>-3ra y 4ta SDG:</b> se desarrollan de forma considerable, comienza a formarse el SNC y inicios de ojos y orejas</p> <p><b>-4ta a 8va semana SDG:</b> Se desarrollan partes corporales externas de los ojos</p> <p><b>-7ma SDG:</b> se ha formado el hígado, pulmones páncreas riñones del intestino</p> <p><b>-12va semana:</b> el feto mide 10 cm y pesa aproximadamente 19g</p>				
<p>Segundo trimestre</p>	<p><b>-14va semana SDG:</b> se pueden detectar movimientos del feto</p> <p><b>-18SDG:</b> La mujer puede sentir movimientos durante 2 a 4 semanas y se puede detectar latidos cardiacos</p> <p><b>20 SDG:</b> el feto abre sus ojos por primera vez</p> <p><b>24 SDG:</b> es sensible a la luz y se pueden escuchar sonidos en el útero</p>	<div data-bbox="868 1270 1372 1323" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Segundo Trimestre Del Embarazo</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Mes 4</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> </div> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Mes 5</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> </div> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Mes 6</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> </div> </td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">www.sanayhermosa.com</p>	<p>Mes 4</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> </div>	<p>Mes 5</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> </div>	<p>Mes 6</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> </div>
<p>Mes 4</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> </div>	<p>Mes 5</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> </div>	<p>Mes 6</p>  <div style="font-size: small;"> <p>Semanas</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> </div>			
<p>Tercer trimestre</p>	<p>-La piel del feto esta arrugada y cubierta de vello sedoso</p>				

	<p>-se forman depósitos de grasa debajo piel (tejido adiposo)</p> <p>-<b>7mo mes:</b> el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza</p> <p><b>Final 8vo mes:</b> pesa en promedio 2500 gr</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Tercer Trimestre Del Embarazo</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Mes 7</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Mes 8</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Mes 9</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>           Semanas            28            29            30            31         </td> <td>           Semanas            32            33            34            35         </td> <td>           Semanas            36            37            38            39            40         </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">www.sanayhermosa.com</p> </div>	<b>Mes 7</b>	<b>Mes 8</b>	<b>Mes 9</b>				Semanas 28 29 30 31	Semanas 32 33 34 35	Semanas 36 37 38 39 40
<b>Mes 7</b>	<b>Mes 8</b>	<b>Mes 9</b>									
											
Semanas 28 29 30 31	Semanas 32 33 34 35	Semanas 36 37 38 39 40									

Primer trimestre	<p><b>Cambios físicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pezones se oscurecen y amplían</li> <li>• Aumenta exudados vaginales</li> <li>• Sentimientos fatiga y sueño</li> <li>• Micciones frecuentes</li> <li>• Crecimiento del útero</li> <li>• Nauseas matutinas</li> </ul>	<p><b>Cambios psicológicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existen mayores posibilidades de depresión</li> <li>• Disponibilidad apoyo social</li> <li>• Cambios hormonales y cambios de estados <b>animo</b></li> </ul>
Segundo trimestre	<p><b>Cambios físicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4mes movimiento fetal</li> <li>• El vientre se expande</li> <li>• Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre</li> <li>• Edema en cara, manos ,muñecas, tobillos y pies</li> <li>• Las mamas crecen</li> <li>• Sangrados nasales</li> <li>• Estreñimiento</li> </ul>	<p><b>Cambios psicológicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta los sentimientos de cuidado o de interés materno</li> <li>• Disminuye el temor de aborto espontaneo</li> <li>• Perdida de calma y bienestar relativo</li> <li>• Menos probabilidad depresión</li> </ul>
Tercer trimestre	<p><b>Cambios físicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 semanas antes del nacimiento el bebe rota y la cabeza descende pelvis</li> <li>• El ombligo se va empujando hacia afuera</li> <li>• Dolor y incomodidad</li> </ul>	<p><b>Cambios psicológicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menos sucesos estresantes</li> <li>• Mayor ingresos</li> <li>• Apoyo social</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contracciones de braxton-hicks</li> <li>• Falta respiración</li> <li>• Disminución energía</li> <li>• Aumento peso</li> <li>• Aumento volumen sanguíneo</li> <li>• indigestión</li> </ul>	
--	--	--

<b>Signos presuntivos</b>	<p><b>Signos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nauseas</li> <li>• Vómitos</li> <li>• aversión olores</li> <li>• Mareo</li> <li>• Fatiga</li> <li>• Somnolencia</li> <li>• Oscurecimiento areolas y cicatrices antiguas</li> </ul>	<p><b>Diagnostico</b></p> <p>Se detecta en sangre materna a partir de la implantación y en orina a partir de la quinta semana de amenorrea</p>
<b>Probables</b>	<p><b>Signos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amenorrea</li> <li>• Signos bulbo</li> <li>• Signos Chadwick</li> <li>• Prueba inmunológica</li> <li>• Gonadotropina detectable de 8 a 11 días 25 mayor u/ml</li> </ul>	<p><b>Diagnostico</b></p> <p>Edad gestacional: Regla neagele</p>
<b>Confirmativos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visualización mediante saco gestacional USg</li> <li>2. Auscultaciones de focos cardiacos</li> <li>3. Palpaciones fetales</li> <li>4. Ultrasonido</li> </ol>	

## Bibliografía

shibley, J. (s.f.). *Sexualidad humana* (9na ed.). Ciudad de mexico: MC graw hill. Recuperado el 13 de Octubre de 2023