



Carlos Alberto Hernández Meza

**DRA. Saucedo Domínguez Mariana
Catalina**



Sexualidad humana

Grado: 3

Grupo: B



1er trimestre

En la tercer SDG el embrión mide cerca de 0.2 cm

Entre La tercera y cuarta SDG empieza la formación del sistema nervioso central, también empieza la formación de ojos y las orejas la columna vertebral se termina de formar a finales de la cuarta semana

En la octava semana, se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas pies y dedos de los pies. Para finales de la séptima semana, se han formado, el hígado pulmones, riñones e intestino.

Finalizando duodécima semana, el feto mide cerca de 10 cm y pesa aproximadamente alrededor de 19 gr.




2do trimestre

En la decimoctava semana, la mama puede sentir los movimientos durante dos a cuatro semanas y también se podrán detectar el latido cardiaco del feto.

En vigésima semana, El feto abre sus ojos por primera vez

Alrededor de la vigésimo cuarta semana. Los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño

Al final del segundo trimestre, la piel del feto esta arrugada y cubierta de un vello sedoso.



3er trimestre

Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel. Y se pierde el vello sedoso.

El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza aproximadamente durante el séptimo mes.

Al final del octavo mes, en promedio 2,500 gramos. El crecimiento del feto durante los últimos dos meses es veloz. El bebé promedio a término pesa 3,300 gramos y mide 50 centímetros.

Cambios físicos

Cambios psicológicos

1er trimestre

elevado aumento en niveles de hormonales en especial de estrógeno y progesterona. Los pezones y el área que los rodea pueden oscurecerse y ampliarse. Algunas mujeres experimentan náuseas matutinas, sentimiento de náusea, tal vez hasta llegar al vomito y repulsión hacia la comida o hacia su olor

Los bajos ingresos se asocian con la depresión durante el embarazo. Las mujeres que cuentan con una pareja que las apoya tienen menores probabilidades de estar deprimidas, tal vez porque la pareja funge como amortiguador ante los sucesos estresantes.

2do trimestre

la mujer se concientiza de los movimientos del feto. Es posible que el edema sea un problema en cara, manos, muñeca, tobillo y pies. Aproximadamente a la mitad del embarazo, las mamas, a causa de la estimulación hormonal,

Disminuye el temor de un aborto espontáneo a medida que la mujer siente los movimientos del feto. Existen menos probabilidades de depresión durante el segundo trimestre si la mujer tiene una pareja o esposo que cohabite con ella. Los investigadores también indican que las creencias de la mujer acerca del embarazo y acerca de cómo se debería comportar durante el mismo están bajo influencias culturales

3er trimestre

Para el tercer trimestre, el útero es muy grande y duro. el tamaño extremo del útero ejerce presión sobre otros órganos, hay presión sobre los pulmones, el estómago también se oprime, el corazón se encuentra bajo presión a causa del considerable aumento en volumen sanguíneo. En ocasiones el útero se constriñe de manera dolorosa en las llamadas contracciones de Braxton-Hicks.

El bienestar psicológico es mayor entre aquellas mujeres que cuentan con un apoyo social, que tiene mayores ingresos/pertenecen a la clase media, y que experimentan menos sucesos vitales estresantes concurrentes.



Signos confirmatorios

Aumento de exudado vaginales, micciones frecuentes, crecimiento del útero, aumento de estrógeno y progesterona, Los pezones se oscurecen y amplían las mamas se inflaman y hormiguean.



Signos presuntivos o probables

Temperatura corporal basal elevada, sensibilidad en las mamas, vomito, fatiga, altos niveles de progesterona, nauseas, micción frecuente



Pruebas de detección

Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de HCG, pruebas de laboratorio, pruebas modernas de orina, radio inmunológicas beta-HCG