



Claudia Patricia Abarca Jiménez
Oscar Eduardo Guillen Sánchez

DR. Mariana Catalina Saucedo
Dominguez

Cuadro comparativo de las ETS

PASIÓN POR EDUCAR

Sexualidad humana

3°


“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de noviembre del 2023

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

NOMBRE	DEFINICION	FX DE EPIDEMIOLOGÍA	CUADRO CLÍNICO	DIAGNOSTICO	TRATAMI
<p>HERPES (Herpes virus)</p>	<p>Infección de transmisión sexual en la que los síntomas son protuberancias o ampollas pequeñas y dolorosas en los genitales. CLASIFICACIÓN Herpes genital, varicela zóster, citomegalovirus, Epstein Barr.</p>	<p>Mujeres Estudiantes Afroamericanos Se estima que 45 millones de estadounidenses 22 por ciento de las personas de 12 años de edad o mayores están infectados</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pequeñas protuberancias dolorosas en los 2. Genitales 3. Fiebre 4. Dolores de cabeza 5. Úlceras dolorosas que se forman cuando las ampollas se rompen y exudan o sangran 6. Micción dolorosa 7. Secreción de la uretra 8. Secreción de la vagina 	<ul style="list-style-type: none"> • Clínica • Reacción de Giamsa (Tzank) • Biopsia 	<p>LOCAL Aciclovir crema Compresas de SISTEMICO 1era vez: Aciclovir 200 m Veces al día Después: Aciclovir 400 m 800 mg / 12 hrs</p>
<p>SIFILIS Treponema pallidum</p>	<p>infección de transmisión sexual que produce la aparición de un chancro en la etapa primaria.</p>	<p>La incidencia de sífilis es mucho menor que la de gonorrea o clamidia. Hubo 7 000 casos nuevos reportados en el 2002, una disminución notable de lo que fueron al principio de la década de 1990</p>	<p>PRIMARIA Una pequeña llaga o úlcera abierta e indolora (llamada chancro) que sana por sí sola en 3 a 6 semanas SECUNDARIA Una erupción cutánea, generalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies Úlceras llamadas parches Parches húmedos y verrugosos (Fiebre Indisposición general Falta de apetito Dolores musculares y articulares Inflamación de los ganglios linfáticos Cambios en la visión Pérdida del cabello TERCER: afectación a órganos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VDRL • TNA-ABS 	<p>Penicilina G b 2.4 millones intramuscular millones en ca 1 cada seman semanas</p>

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

NOMBRE	DEFINICIÓN	FX DE EPIDEMIOLOGIA	CLÍNICA	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	IMAGEN
<p>LINFO GRANULOMA VENEREO</p> <p>Chlamydia trachomatis</p>	<p>Enfermedad de transmisión sexual (ETS) o infección que compromete los ganglios linfáticos del área genital</p>	<p>El linfogranuloma venéreo se produce sobre todo en zonas tropicales y subtropicales. No obstante, se han notificado brotes en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres en Europa, América del Norte y Australia.</p>	<p>PRIMERA FASE</p> <p>Papula y vesículas</p> <p>SEGUNDA</p> <p>Dolor</p> <p>Nodulo--- Goma</p> <p>Signo de reloj de arena</p> <p>TERCERA (complicación)</p> <p>Microabscesos</p> <p>Fistulas</p> <p>Edema genital</p>	<ul style="list-style-type: none"> Exudado PCR 	<p>Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 21 días</p>	
<p>GRANULOMA INGUINAL</p> <p>Klebsiella granulomatis</p>	<p>El granuloma inguinal es una infección progresiva de la piel genital y perineal causada por Klebsiella (antes denominado Calymmatobacterium) granulomatis</p>	<p>Las infecciones por Klebsiella granulomatis son extremadamente raras en países con altos recursos, pero se han informado en áreas como Papua Nueva Guinea, Australia, el sur de África, el Caribe y ciertas áreas de Brasil e India</p>	<p>nódulo cutáneo eritematoso indoloro-→lesión sobreelevada húmeda y lisa de color rojo carnosos y olor desagradable -> ulcera -> cicatriz</p> <p>Puede afectar a circulación sanguínea a los huesos, las articulaciones o el hígado sin TX</p>	<p>Examen microscópico que muestra los cuerpos de Donovan en el líquido obtenido de una lesión</p> <p>Biopsia</p>	<p>Azitromicina en dosis de 1 g una vez a la semana o 500 mg por día durante no menos de 3 semanas</p>	

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

NOMBRE	DEFINICION	FX DE EPIDEMIOLOGÍA	CUADRO CLÍNICO	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	IMAGEN
<p>GONORREA Neisseria Gonorrhoeae</p>	<p>La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae y la puede propagar cualquier tipo de actividad sexual. Se puede contraer por contacto con la boca, la garganta, los ojos, la uretra, la vagina, el pene o el ano.</p>	<p>Las bacterias proliferan en zonas corporales húmedas y cálidas, incluso el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo (uretra). En las mujeres, las bacterias se pueden encontrar en el aparato reproductor</p>	<p>Dolor y ardor al orinar Aumento de la frecuencia o urgencia urinaria Secreción del pene (de color blanco, amarillo o verde) Abertura del pene (uretra) roja o inflamada Testículos sensibles o inflamados MUJERES Dolor y ardor al orinar Dolor de garganta Relaciones sexuales dolorosas Dolor intenso en la parte baja del abdomen Fiebre Sangrado después de tener relaciones Secreción vaginal anormal color verdosa, amarillenta o con mal olor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clínica • Microscopio • Tinción de GRAM • PCR 	<p>Cetriaxona 250 mg IM D.U</p>	
<p>CLAMIDIA Chlamydia trachomatis</p>	<p>La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Cualquier persona puede contraer clamidia. A menudo no causa síntomas</p>	<p>Más común en personas jóvenes, especialmente mujeres. Es más probable que se infecte con clamidia si no usa un condón constantemente o si tiene varias parejas sexuales.</p>	<p>MUJERES Flujo vaginal blanco, amarillento con prurito Disfureunia Sensación de ardor al orinar Provoca EPI HOMBRES Secreción del pene Sensación de ardor al orinar Dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común</p>	<p>Exudado</p>	<p>Azitromicina 1 gr vía oral, dosis única por 3 semanas.</p>	 <p><small>Foto 2. Lesiones verrucosas superficiales de mucosa genital</small></p>


ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

NOMBRE	DEFINICIÓN	FX DE EPIDEMIOLOGIA	CLÍNICA	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	IMAGEN
<p>CANDIDIACIS Candida albicans</p>	<p>Una infección por hongos vaginales es una infección micótica que provoca irritación, flujo e intensa picazón en la vagina y la vulva, los tejidos que se encuentran en la apertura vaginal</p>	<p>Existe un mayor riesgo de infección por hongos vaginales al tener actividad sexual regular por primera vez. También hay indicios de que las infecciones pueden relacionarse con el contacto entre la boca y los genitales</p>	<p>Picazón e irritación de la vagina y la vulva Sensación de ardor, especialmente durante las relaciones sexuales o al orinar Enrojecimiento o inflamación de la vulva Dolores y molestias vaginales Sarpullido vaginal Secreción vaginal espesa, blanca y sin olor, con aspecto similar al queso cottage Secreción vaginal acuosa.</p>	<p>Clínica Examen pélvico exudado</p>	<p>Crema antimicótica durante uno a tres días curan las infecciones leves Miconidazol + ovulos</p>	
<p>TRICOMONIASIS</p>	<p>Enfermedad de transmisión sexual causada por un parásito. Se contagia de persona a persona a través de relaciones sexuales. Muchas personas no muestran síntomas</p>	<p>Las mujeres embarazadas con tricomoniasis tienen más probabilidades de dar a luz en forma prematura, y es más probable que sus bebés tengan bajo peso al nacer.</p>	<p>Secreción vaginal verdosa o amarillenta Molestia durante las relaciones sexuales Olor vaginal Dolor al orinar Comezón, ardor y dolor en la vagina y la vulva Cervix en fresa Hombre= Balanopostitis</p>	<p>Examen en fresco Tinción de Gram</p>	<p>Metronidazol</p>	

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

NOMBRE	DEFINICIÓN	FX DE EPIDEMIOLOGÍA	CLÍNICA	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	IMAGEN
VIH/ SIDA	es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema inmunitario.	se disemina principalmente: A través del sexo anal o vaginal sin usar condón con alguien que tenga VIH que no tome medicamentos para tratar o prevenir el VIH Por medio de compartir agujas u otro equipo usado para inyectarse drogas con alguien que tiene VIH	Fiebre y dolor muscular Dolor de cabeza Dolor de garganta Sudoración nocturna Úlceras bucales, incluso infección por hongos (candidiasis) Ganglios linfáticos inflamados Diarrea FASE 1: Progresa hasta convertirse crónica o asintomática (fase 2) = sin síntomas	Pruebas de laboratorio Pruebas caseras	La infección por el VIH no tiene cura, pero el TAR detiene la multiplicación del virus. Los TAR evitan que el sistema inmune se decaiga más.	
CITOMEGALOVIRUS (Virus herpes)	El CMV es un tipo del virus del herpes. Todos los virus del herpes permanecen en el cuerpo durante toda la vida después de la infección	Entre el 60 y el 90% de los adultos han sufrido una infección por CMV en algún momento. El CMV puede causar síntomas poco después de la infección.	Fatiga Fiebre Dolor de garganta Dolores musculares EMBARAZO Aborto Nacimiento prematuro Bajo peso al nacer Piel y ojos de color amarillo (ictericia) Agrandamiento y funcionamiento deficiente del hígado	PCR Anticuerpos Pruebas de laboratorio	Anticuerpos Reposo Antivirales	

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

NOMBRE	DEFINICION	FX EPIDEMIOLOGIA	CLÍNICA	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	IMAGEN
<p>CHANCROIDE Haemophilus ducreyi</p>	<p>El chancroide es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) producida por una bacteria. Es común en países tropicales, aunque rara en otras partes del mundo.</p>	<p>Es más común en los hombres que en las mujeres, especialmente en los hombres sin circuncisión.</p>	<p>Pápulas dolorosas Ulceras Bubón Piel eritematosa y brillante Fimosis Estenosis uretral Fistulas uretrales</p>	<p>Clinica PCR Cultivo</p>	<p>Una dosis única de azitromicina 1 g por vía oral o ceftriaxona 250 mg IM</p>	
<p>HEPATITIS C Virus del hepatitis C</p>	<p>La hepatitis es la inflamación del hígado. Inflamación es la hinchazón de órganos que ocurren cuando los órganos se lesionan o infectan.</p>	<p>El virus se propaga por el contacto con la sangre contaminada, por ejemplo, al compartir agujas o utilizar equipos de tatuaje no esterilizados.</p>	<p>AGUDA Orina de color amarillo oscuro Fatiga Fiebre Heces grises o color de arcilla Dolor en las articulaciones Pérdida de apetito Náusea y / o vómitos Dolor abdominal Ictericia (ojos y piel amarillentos) CRONICA Síntomas hasta complicación</p>	<p>Enzimoimmunoanálisis (EIA) PCR</p>	<p>Antivirales vía oral, de 8 a 24 semanas.</p>	

REFERENCIAS:

Sexualidad Humana. Novena edición ed., Janet shibley Hyde. John D. Delamater.

"VIH Y Sida." Www.who.int, www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hi.

"Tricomoniasis." Medlineplus.gov, medlineplus.gov/spanish/trichomoniasis.html.

"Candidosis Vaginal - Diagnóstico Y Tratamiento - Mayo Clinic."

"Infecciones Por Clamidia." Medlineplus.gov, medlineplus.gov/spanish/chlamydiainfections.html.

"Gonorrea: MedlinePlus Enciclopedia Médica." Medlineplus.gov, medlineplus.gov/spanish/ency/article/007267.htm.