



Jhonatan Gamaliel Vazquez Cruz

**Mariana Catalina Saucedo
Dominguez**

Cuadros comparativos

Sexualidad Humana

PASIÓN POR EDUCAR

3

B

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023.

Cuadro comparativo del desarrollo fetal

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
2da SDG. El embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 cm	14va. SDG: Se pueden detectar los movimientos del feto.	7mo. mes: el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza.
3ra y 4ta SDG. La cabeza e desarrolla de forma considerable, comienza a formarse el SNC, inicios de ojos y orejas, la columna vertebral a finales de 4ta. Semana.	18 SDG: La mujer puede sentir movimientos durante 2 a 4 semanas y el medico puede detectar el latido cardiaco.	Final del 8vo. mes: pesa en promedio 2 500 gr.
4ta a 8va SDG. Se desarrollan partes corporales externas del feto como los: ojos, orejas, brazos, manos, piernas, pies y dedos.	20 SDG: el feto abre sus ojos por primera vez.	La piel del feto esta arrugada y cubierta de vello sedoso
Finales de la 7ma SDG. Se ha formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino en el feto.	24 SDG: es sensible a la luz y se pueden escuchar sonidos en el útero	Se forman depósitos de grasa debajo de la piel y el vello sedoso desaparece
12va SDG. El feto mide 10 cm y pesa aprox. 19 gr.		

Cuadro comparativo de cambios físicos y psicológicos

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE	
Cambios físicos	Cambios psicológicos	Cambios físicos	Cambios psicológicos	Cambios físicos	Cambios psicológicos
<p>Los pezones se oscurecen y amplían. Sentimientos de fatiga y sueño. Micciones frecuentes. Náuseas matutinas. Aumento de estrógeno y progesterona. Las manos se inflaman.</p>	<p>La disponibilidad de apoyo social. Su clase social en la mujer. Su actitud hacia el embarazo.</p>	<p>4° mes se da el movimiento del feto. Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre. A la mitad del embarazo, las mamas a completan su desarrollo para el amamantamiento. Sangrados nasales. Estreñimiento</p>	<p>Las creencias de la mujer embarazada están bajo influencias culturales. Aumentan los sentimientos de cuidado o de interés materno. Periodo de calma y bienestar relativos. Menos probabilidad de tener depresión.</p>	<p>El ombligo se ve empujado hacia afuera. Incomodidad. Mayor indigestión. Falta de respiración. Aumento de peso. El útero es muy grande y duro.</p>	<p>Mas apoyo social. Siente que necesita de más ingresos</p>

Cuadro comparativo sobre signos

SIGNOS PRESUNTIVOS O PROBABLES	SIGNOS CONFIRMADOS	PRUEBAS DE DETECCION.
Existe una ausencia de la menstruación, la temperatura corporal basal se ve elevada, una mayor sensibilidad en las mamas, aparición de vomito, fatiga, náuseas, existe o tiene una micción muy frecuente, siente y tiene necesidad de orinar mas.	Los pezones se oscurecen y se amplían, existe aún micciones frecuentes, el útero comienza a crecer, hay un aumento de estrógeno y progesterona, los pechos se inflaman y siente que hormiguean.	Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de HCG. Pruebas de laboratorio Pruebas de orina Radio inmunológicas beta-HCG .

SHIBLEY HYDE, J., & DELAMATER, J. (9NA EDICIÓN). SEXUALIDAD HUMANA. MÉXICO: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA