



**JUAN PABLO ABADIA LOPEZ**

**DRA. SAUCEDO DOMINGUEZ  
MARIANA CATALINA**

**Cuadros comparativos**

**SEXUALIDAD HUMANA**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**3**

**B**

Comitán de Domínguez Chipas a 12 de octubre del 2023

## DESARROLLO FETAL

PRIMER TRIMESTRE 1- 12 SEMANAS	SEGUNDO TRIMESTRE 13-26 SEMANAS	TERCER TRIMESTRE SEMANA 27-PARTO
<p>Cambios mas notables</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3ra semana. Parece un trozo carne y mide 0.2 cm</li> <li>➤ Semana 3 y 4: Empieza el desarrollo de la cabeza, SNC y puede observarse los inicios de ojos y orejas</li> <li>➤ Final de 4ta semana: se forma la columna vertebral</li> <li>➤ Final de la semana 7: Formación de hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y empieza el funcionamiento limitado, así como la formación de gónadas</li> <li>➤ 4-8 semana se desarrolla las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies.</li> <li>➤ Final de semana 10: formación de uñas</li> <li>➤ Final de semana 12: toma forma de lactante y sus medidas son aprox 10cm y pesa 19g</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Final de semana 14: se puede detectar los movimientos del feto</li> <li>➤ Semana 18: La madre puede sentir los movimientos y el medico puede detectar el latido del feto</li> <li>➤ Semana 20: El feto abre los ojos por primera vez</li> <li>➤ Semana 24: Él bebe es sensible a la luz y puede escuchar sonidos y los movimientos de brazos y piernas vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño</li> <li>➤ Final de segundo trimestre: La piel del feto esta arrugada y cubierta de un vello sedoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Semana 27: se forman depósitos debajo de la piel, se pierde el bello sedoso</li> <li>➤ Durante el mes 7: el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza</li> <li>➤ Final de 8vo mes: en promedio pesa 2500 gramos</li> <li>➤ Final del mes 8: pesa 2.5 kg aprox</li> <li>➤ Bebe a término : en promedio pesa 3300 gramos y mide 50 cm</li> </ul>

## CAMBIOS FISICOS Y PSICOLOGICOS MATERNOS

PRIMER TRIMESTRE 1-12 SEMANAS	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
<p style="text-align: center;"><u>CAMBIOS FISICOS</u></p> <p><b>INICIALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cesa de menstruación</li> <li>• Cambio de temperatura brusco cerca de ovulación y se mantiene elevada</li> <li>• Náuseas y vómitos</li> <li>• Sensación de fatiga</li> <li>• Necesidad de dormir</li> </ul> <p><b>POSTERIORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de niveles hormonales (estrógeno y progesterona)</li> <li>• Inflamación y hormigueo de mamas</li> <li>• Pezones y areola se amplía y oscurecen</li> <li>• Exudados vaginales</li> </ul> <p><b>CAMBIOS PSICOLOGICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansiedad si él bebe no era deseado y menor si era</li> <li>• Depresión relacionada a tener recursos bajos</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>CAMBIOS FISICOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empieza aumento de peso</li> <li>• Desaparición de síntomas físicos de primer trimestre</li> <li>• Mujer se concientiza de movimientos fetales</li> <li>• Notable aumento del vientre</li> <li>• Posible edema; cara, manos, muñecas, tobillos Y pies</li> <li>• Posible excreción de calostro</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CAMBIOS PSICOLOGICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Símbolo de feminidad- torpes y resistida</li> <li>• Angustia en mujeres con embarazos anteriores</li> <li>• Aumenta el sentimiento de cuidado materno</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>CAMBIOS FISICOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Útero grande y duro</li> <li>• Dificultad para conciliar el sueño</li> <li>• Disnea</li> <li>• Indigestión</li> <li>• Ombligo empujado hacia afuera</li> <li>• Disminución de energía</li> <li>• Aumento de volumen sanguíneo</li> <li>• Aumento de peso</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CAMBIOS PSICOLOGICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bienestar psicológico en embarazadas con apoyo social – económico</li> </ul>

## SIGNOS

SIGNOS PRESUNTIVOS	SIGNOS PROBABLES	SIGNOS POSITIVOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• amenorrea</li><li>• sensibilidad de las mamas</li><li>• nauseas</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>PRUEBAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prueba inmunológica basada en</li><li>• la detección de la presencia de hCG</li><li>• Pruebas de laboratorio</li><li>• Pruebas modernas de orina</li><li>• Radioinmunoanálisis beta -hCG</li><li>• Pruebas casera<ul style="list-style-type: none"><li>➤ First Response</li><li>➤ Clear Blue</li><li>➤ Fact Plus</li></ul></li></ul> <p style="text-align: center;"><b><u>REALIZACION</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• entre las semanas 15 y 20 del embarazo</li><li>• 1-2 semanas después de la ausencia de la menstruación</li><li>• 7 días después de la implantación</li><li>• 7 días después de la Fertilización</li><li>• 1 días después de la ausencia de la menstruación</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• latido del corazón fetal</li><li>• Movimiento fetal activo</li><li>• detección del esqueleto fetal</li><li>• por medio de ultrasonido</li></ul>

