



**Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano**

**Dra. Mariana Catalina Saucedo**

**Cuadro comparativo**

**Sexualidad humana**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**3°**

**“B”**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023.

## Desarrollo fetal por trimestre

### Primer trimestre: El desarrollo más notable

#### 2da SDG

El embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 cm

#### 3ra y 4ta SDG

la cabeza e desarrolla de forma considerable, comienza a formarse el SNC, inicios de ojos y orejas, la columna vertebral a finales de 4ta. sem.

#### 4ta. a 8va. SDG

Se desarrollan partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, piernas, pies y dedos.

#### Finales de 7ma. SDG

Se ha formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino

#### 12va. SDG

El feto mide 10 cm y pesa aprox. 19 gr

<b>Segundo trimestre</b>	
<b>14va. SDG</b>	Se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento)
<b>18 SDG</b>	La mujer puede sentir movimientos durante 2 a 4 semanas y el medico puede detectar el latido cardiaco.
<b>20 SDG</b>	El feto abre sus ojos por primera vez
<b>24 SDG</b>	Es sensible a la luz y se pueden escuchar sonidos in utero.
<b>Tercer trimestre:</b> <b>La piel del feto esta arrugada y cubierta de vello sedoso.</b> <b>Se forman depositos de grasa debajo de la piel y el vello Sedoso desaparece.</b>	
<b>7mo. Mes</b>	El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza.
<b>Final del 8vo. Mes</b>	Pesa en promedio 2 500 gr

Trimestre	Cambios Físico	Cambios Psicológico
<b>Primer trimestre</b>	<p>Los pezones se oscurecen y amplian</p> <p>Aumento de exudados vaginales</p> <p>Sentimientos de fatiga y sueño</p> <p>Aumento de estrógeno y progesterona</p> <p>Las mamas se inflaman y hormiguean</p> <p>Micciones frecuentes</p> <p>Crecimiento del útero</p> <p>Náuseas matutinas</p>	<p>La disponibilidad de apoyo social</p> <p>Su actitud hacia el embarazo</p> <p>Su clase social</p> <p>Existen mayores probabilidades de que se presente una depresión durante el primer día trimestre del embarazo</p>
<b>Segundo trimestre</b>	<p>4° mes se da el movimiento del feto</p> <p>El vientre esta en rápida expansión</p> <p>Desaparece la mayoría de los</p> <p>síntomas físicos del primer trimestre</p> <p>Sangrados nasales</p> <p>Estreñimiento</p>	<p>Las creencias de la mujer embarazada están bajo influencias culturales</p> <p>Aumentan los sentimientos de cuidado o de interés materno</p> <p>Disminuye el temor de un aborto espontáneo</p> <p>Menos probabilidades de depresión</p>
<b>Tercer trimestre</b>	<p>4 semanas antes del nacimiento, el bebé rota y la cabeza desciende a la pelvis</p> <p>El ombligo se ve empujado hacia afuera</p> <p>Indigestión</p> <p>Aumento del volumen sanguíneo</p>	<p>Menos sucesos estresantes</p> <p>Mayores ingresos</p> <p>Apoyo social</p>

	<p>Falta de respiración</p> <p>El útero es muy grande y duro</p> <p>Incomodidad</p> <p>Contracciones de Braxton-Hicks</p> <p>Disminución de energía</p>	
--	---	--

### Signos presuntivos, probable y confirmatorio del embarazo

Presuntivos	Probables	Confirmativos
<p><b>Digestivo: Nauseas, vómitos, sialorrea, estitiquez.</b></p> <p>• <b>Nervioso: Somnolencia, irritabilidad, labilidad emocional, Insomnio, fatigabilidad, apetito caprichoso, aversión a ciertos olores</b></p> <p><b>Urinario: Poliaquiria</b></p> <p>• <b>Mamas: Tensión, sensibilidad, calostro, corpúsculos de Montgomery (glándulas periareolares), pigmentación pezón y areola, red venosa aumentada, estrías.</b></p> <p>• <b>Abdomen: Aumento de volumen, línea</b></p>	<p>Atraso Menstrual</p> <p>• Vulva y Vagina: tumefacción y hiperemia, moco opaco y filante, aumento de la leucorrea fisiológica • Chadwick: coloración violácea de las paredes vaginales</p> <p>• Útero: cérvix blando, útero aumentado de volumen, cambio en la forma uterina, cambio de consistencia uterina</p> <p>• Crecimiento uterino:</p> <p>12 semanas: palpable</p> <p>15 semanas: punto intermedio entre ombligo y sínfisis</p> <p>20 semanas: en el ombligo, mide 20cm</p>	<p>Comprobación de la frecuencia cardíaca fetal</p> <p>Movimientos fetales</p> <p>Palpación de las partes fetales</p> <p>Exámenes de b-hCG</p>

<p><b>parda, aumento de vello</b></p> <p><b>Extremidades Inferiores Dilatación venosa, várices</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre las semanas 18 y 32 hay concordancia entre la altura uterina y las semanas de gestación</li> </ul> <p>Signos clásicos (actualmente en desuso)</p> <p>. Piscasek Asimetría en los cuernos</p> <p>Noble &amp; Budin disminución de la profundidad del fondo de saco lateral</p> <p>Osciander pulso palpable en fondos de saco laterales .</p> <p>McDonald: Fácil flexión del cuerpo uterino sobre el cervix (7 a 8 semanas)</p> <p>Hegar I. Reblandecimiento istmico que permite alcanzar paredes anterior y posterior del útero</p> <p>Hegar II reblandecimiento del cuerpo permite alcanzar el fondo de saco anterior y maniobra abdominal (6 a 8 sem)</p> <p>Goodel: reblandecimiento y cianosis del cuello uterino</p>	
--	---	--

## Bibliografía

*Sexualidad humana* (Novena, Vol. 1). (2003). Janet shibley hyde.