

**Nahara Ageleth Figueroa Caballero**

**Dra. Mariana Catalina Saucedo  
Domínguez**

**Cuadros comparativos**

**Sexualidad humana**

PASIÓN POR EDUCAR

**3°**

**“B”**

# Desarrollo Fetal

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre
Las pequeña masa de células implantadas en el útero se convierte en un feto con la mayoría de sistemas y rasgos humanos reconocibles	<b>14va. SDG:</b> Se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento)	La piel del feto esta arrugada y cubierta de vello sedoso.
<b>2da SDG:</b> el embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 cm.	<b>18 SDG:</b> La mujer puede sentir movimientos durante 2 a 4 semanas y el medico puede detectar el latido cardiaco.	Se forman depósitos de grasa debajo de la piel y el vello sedoso desaparece.
<b>3ra y 4ta SDG:</b> la cabeza e desarrolla de forma considerable, comienza a formarse el SNC, inicios de ojos y orejas, la columna vertebral a finales de 4ta. sem.	<b>20 SDG:</b> el feto abre sus ojos por primera vez	<b>7mo. mes:</b> el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza.
<b>4ta. a 8va. SDG:</b> se desarrollan partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, piernas, pies y dedos.	<b>24 SDG:</b> es sensible a la luz y se pueden escuchar sonidos en útero.	<b>Final del 8vo. mes:</b> pesa en promedio 2 500 gr.
<b>Finales de 7ma. SDG:</b> Se ha formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino.		El bebé promedio a termino pesa 3 300 gr y mide 50 cm
<b>12va. SDG:</b> El feto mide 10 cm y pesa aprox. 19 gr.		

# cambios físicos y psicológicos

Primer trimestre	Primer trimestre	Segundo trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Tercer trimestre
Cambios físicos	Cambios psicológicos	Cambios físicos	Cambios psicológicos	Cambios físicos	Cambios psicológicos
Los pezones se oscurecen y se amplían	Existen mayores probabilidades de que se presente una depresión durante el primer trimestre del Embarazo.	El segundo trimestre consta de las semana 13 a la 26	Las creencias de la mujer embarazada están bajo influencias culturales	El tercer trimestre constade las semanas 27-38	El bienestar psicológico es mayor en mujeres que cuentan con:
Aumento de exudados vaginales	La mujer embarazada pasa de estar muy feliz a la depresión y el llanto.	4to mes, empiezan los movimientos del feto	Aumentan los sentimientos de cuidado o de interés materno	El ombligo se ve empujado hacia afuera	Menos sucesos estresantes
Sentimientos de fatiga y sueño	Es estado emocional de una mujer embarazada varia según:	El vientre esta en rápida expansión	Disminuye el temor de un aborto espontáneo	Contracciones de Braxton-Hicks	Mayores ingresos
Micciones frecuentes	La disponibilidad de apoyo social	Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre	Periodo de calma y bienestar relativos	Disminución de energía	Apoyo social
Crecimiento del útero	Su actitud hacia el embarazo	Edema en cara, manos, tobillos y pies	Menos probabilidades de depresión	Aumento de peso	
Nauseas matutinas	Su clase social	A la mitad del embarazo, las mamas a completan su desarrollo para el amamantamiento		Incomodidad	
Aumento de estrógeno y progesterona		Sangrados nasales		Falta de respiración	
Las mamas se inflaman y comienza un hormigueo		Estreñimiento		El útero es muy grande y duro	
				Aumento del volumen sanguíneo	
				Indigestión	

# signos presuntivos

Signos presuntivos	Confirmados	Pruebas de detección
Vomito	Mamas inflamadas y hormigueo	Prueba inmunológica en la detección de la presencia de hCG, se realiza a los 10 días después de la relación sexual
Nauseas	Crecimiento del útero o abdomen hinchado	Pruebas de laboratorio
Micción frecuente	Nauseas matutinas	Pruebas modernas de orina, se realiza entre los 10 y 15 días
Fatiga	Aumento del flujo vaginal	
Sensibilidad en las manos		
Ausencia de la menstruación		

## Referencia bibliográfica

SHIBLEY HYDE, J., & DELAMATER, J. (9NA EDICIÓN). SEXUALIDAD HUMANA.  
MÉXICO: MCGRAW HILL/INTERAMERICANA

