



Nombre del alumno:

Karina Montserrat Méndez Lara

Nombre del profesor:

Dr. Luis Enrique Guillén Reyes

**Nombre del trabajo: Vías de
Administración**

Materia: Farmacología

Grado: 3

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "C"

VÍA	BIODISPONIBILIDAD %	CARACTERÍSTICAS
<i>Intravenosa (IV)</i>	100	Inicia más rápido
<i>Intramuscular (IM)</i>	75 a \leq 100	A menudo es posible administrar grandes volúmenes; puede ser dolorosa.
<i>Subcutánea (SC)</i>	75 a \leq 100	Volúmenes menores que la IM; puede ser dolorosa.
<i>Oral (VO)</i>	5 a $<$ 100	Más conveniente, efecto de primer paso puede ser significativo.
<i>Rectal</i>	30 a $<$ 100	Menor efecto de primer paso respecto a la vía oral.
<i>Inhalación</i>	5 a $<$ 100	A menudo de inicio muy rápido.
<i>Transdérmica</i>	80 a \leq 100	Casi siempre es de absorción muy lenta; se usa para evitar el efecto de primer paso; duración prolongada del efecto.

Bibliografía:

- Norris, T. L. (2020). Porth. Fundamentos de Fisiopatología (Sa ed.). Wolters Kluwer Health.