



**Roblero Roblero  
Evangelina Yaquelin  
3°C.**

**Dr. Guillen Reyes Luis  
Enrique.**

**Reporte de vías de  
administración**

**Farmacología**

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de septiembre del 2023

## BIODISPONIBILIDAD

Vía	(%)	Características
Intravenosa (iv)	100 (por definición)	El inicio más rápido
Intramuscular (IM)	75 a $\leq$ 100	A menudo es posible administrar grandes volúmenes; puede ser dolorosa
Subcutánea (sc)	75 a $\leq$ 100	Volúmenes menores que la IM, puede ser dolorosa.
Oral (PO)	5 a $<$ 100	La más conveniente, el efecto de primer paso puede ser significativo.
Rectal (PR)	30 a $<$ 100	Menor efecto de primer paso respecto de la vía oral.
Inhalación	5 a $<$ 100	A menudo de inicio muy rápido.
Transdérmica	80 a $\leq$ 100	Casi siempre absorción muy lenta; se usa para evitar el efecto de primer paso; duración prolongada del efecto.

**Bibliografía:**

Katzung, B. G., & Vanderah, T. W. (2022). *Farmacología básica e clínica*. Artmed Editora.