



Karla Guadalupe Pérez Pérez

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

Crecimiento y Desarrollo

Los Primeros pasos

3

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 13de Octubre del 2023

Nacimiento

¿Nacido a término?
¿Tiene buen tono?
¿Respira a llora?

SI

Permanecer junto a la madre durante la atención de lactancia.
Cuidar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despegar las secreciones si es necesario, secar, evaluación constante.

NO

Cuidar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despegar las secreciones si es necesario, secar, estimular.

¿Apnea, boqueo o FC menor a 100 lpm?

NO

¿Respira con dificultad o cambios persistentes?

SI

VPP
Monitor de SpO₂
Considerar monitor ECG.

Colocar en posición y despegar la vía aérea.
Monitor de SpO₂.
O₂ suplementario según sea necesario. Considerar CPAP.

1 MINUTO

FC menor a 100 lpm.

SI

Verificar movimiento del pecho
Pasos correctivos de la ventilación si es necesario.
TET o máscara laríngea si es necesario.

NO

Atención posterior a la reanimación
- Análisis de la reanimación en equipo.

¿FC menor a 60 lpm?

Intubar si todavía no se hizo compresiones torácicas.
Coordinación con VPP.
O₂ 100%. Monitor ECG.

FC menor a 60 lpm.

SI

Adiuvino IV.

Si la FC continúa por debajo de los 60 lpm: considerar hipovolemia, considerar neumotórax.

— APGAR —

A palidez color de piel.

0 cianosis generalizada

1 cianosis distal

2 Todo rosado.

P ulso. frecuencia cardiaca.

latidos ausentes.

FC < 100/min FC > 100 min

G estos respuesta a estímulos.

Ausentes

Escusos Positivos.

A ctividad tono muscular.

Flacidez

Hipotonico

Tono normal.

R espiración.

Ausente

Lenta e irregular.

Normal llanto.



7-10
ÓPTIMO.



4-6
dificultad moderada.



1-3
dificultad grave.

Silverman - Anderson.

②

Movimientos
toraco-ubdominales.

Ritmicos y
regulares.

①

Torax inmóvil
abdomen movimiento

②

Disociación
toraco ubdominal

Tiraje intercostal.

NO.

Leve / apenas
visible.

Intenso / visible

Retracción xitoides.

NO.

Leve / apenas
visible.

Intenso / visible.

Alceco nasal

NO.

Leve / apenas
visible.

Intenso / visible

Quejido respiratorio.

NO.

Audible con
estetoscopio.

Audible sin
estetoscopio.

Comportamientos

- Evalúe los factores de riesgo personales.
- Identifique al líder del equipo de reanimación.
- Identifique cómo pedir ayuda adicional.
- Deje tareas.
- Conozca su entorno.
- Anticipe y planifique.
- Comuníquese eficazmente.
- Use los recursos disponibles.
- Pida ayuda adicional cuando sea necesario.
- Mantenga una conducta profesional.