



Jorge Yair Alvarado Ramírez

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

“Infografías para todos”

Crecimiento y desarrollo

Grado: 3


Grupo: “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de diciembre del 2023.

comunicación intrerauricular

¿QUE ES?

Un defecto del tabique auricular es un agujero en el corazón, entre las dos cavidades superiores (aurículas). El agujero aumenta la cantidad de sangre que fluye por los pulmones. La afección está presente al nacer (defecto cardíaco congénito).



EPIDEMIOLOGIA

Actual: 10-15% de las cardiopatías congénitas
mujeres y hombres es de 2-4:1

FACTORES DE RIESGO

- Sarampion alemán (rubeola) en primeros meses de embarazo
- Diabetes
- Lupus
- Consumo de alcohol y tabaco
- Consumo de sustancias ilícitas
- uso de framacos (anticonvulsivos)



CLASIFICACION

- Tipo secundum: se produce en la parte media de la pared que separa las cavidades superiores del corazón.
- tipo primum: se produce en la parte baja del tabique auricular y podría aparecer junto con otros problemas cardiacos congenitos.
- Seno venoso: se produce en la parte superior de la pared que separa las cavidades del corazón
- Seno coronario: falta una parte de la pared que se encuentra entre el seno coronario, que forma parte del sistema venoso del corazón y la cavidad superior izquierda del corazón

CLINICA

Suele ser asintomatico en los bebes y en edad adulta pueden llegar a presentar:

- fatiga
- hinchazon de piernas, pies o abdomen
- arritmias
- palpitaciones
- soplo cardiaco

DX

- Radiografia de tórax
- ECG
- Ecografia

tratamiento

- (con evidencia de sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho en la ecocardiografía) deben ser cerradas, en general entre los 2 y 6 años