



**Nombre del alumno: Karen  
Guadalupe Alvarez de la Cruz.**

**Nombre del profesor: Dra. Rosvani  
Margine Morales Irecta.**

**Nombre del trabajo: Flashcards.**

**Materia: Crecimiento y desarrollo.**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grado y Grupo: 3-C**

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de diciembre del 2023.

# Enterocolitis Necrosante

- Muerte del tejido intestinal

## Síntomas

- Distensión abdominal
- Sangre en las heces
- Diarrea
- Problemas en la alimentación
- Falta de energía
- Temp. corporal inestable
- Vómitos

## Exámenes

- Radiografía abdominal
- Examen de la sangre oculta en heces
- Conteo sanguíneo completo

## Tx

- Administrar líquidos IV
- Suspender la alimentación entérica
- Administrar antibióticos IV

# o Comunicación Interventricular o

Se refiere a un orificio en la pared que separa los ventrículos derecho e izquierdo del corazón

## Exámenes de laboratorio

- Cateterismo cardiaco
- Radiografía de tórax
- ECG
- Ecocardiografía



## Sintomas

- \* Dificultad respiratoria
- \* Respiración rápida
- \* Respiración forzada
- \* Palidez
- \* Insuficiencia para aumentar de peso
- \* FC rápida
- \* Sudoración al comer



# Persistencia del conducto Arterioso

Cardiopatía congénita en la que no se cierra, después de tres o cuatro meses posteriores al nacimiento, el conducto natural que se encuentra entre 2 de las principales arterias cardiacas

- \* Aorta
- \* Pulmonar

## Signos y Síntomas

- \* Problemas respiratorios como falta de aire o ritmo excesivamente rápido.
- \* Aceleración en el ritmo cardiaco
- \* Debilidad y fatiga
- \* Falta de apetito
- \* Sudor excesivo al ingerir alimentos o en episodios de llanto

# Comunicación Interauricular

● Defecto cardiaco que esta presente al nacer.

\* Mientras el bebe se desarrolla en el utero, se forma una pared que divide la camara superior en auricula izquierda y derecha. Cuando la pared no se forma correctamente, esto puede provocar una anomalia que permanece despues del nacimiento

## Sintomas

- \* Dificultad respiratoria
- \* Infecciones respiratorias frecuentes en niños
- \* Falta de aliento con la actividad

# Síndrome de aspiración de meconio

- Problemas respiratorios que un recién nacido puede tener cuando el bebé tiene meconio en las disposiciones hacia el líquido amniótico durante el parto o nacimiento

● El SAM puede ocurrir si el bebé inhala el líquido hacia los pulmones

## Síntomas

- Cianosis
- Dificultad para respirar
- Paro respiratorio
- Flacidez



# Taquipnea Transitoria del Recien Nacido

Transtorno respiratorio que se observa poco despues del parto con mayor frecuencia en bebes que nacen antes del término o casi a término

## Tx

\* Administración de oxígeno

## Sintomas

- Cianosis
- Respiración rápida
- Aleteo nasal
- Tiraje intercostal