



Miguel Ángel Calvo Vazquez

Mariana Catalina Saucedo Dominguez

Cuadro comparativo

Sexualidad Humana

3ro

“C”

Desarrollo fetal

Primer trimestre (1-3 meses)	Segundo trimestre (4-6 meses)	Tercer trimestre (7-9 meses)
La pequeña masa de células implantada en el útero se convierte en un feto	decimocuarta semana, se pueden detectar los movimientos del feto	Final del segundo trimestre, la piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.
3ra semana de gestación, el embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 centímetros	Para la decimoctava semana, la mujer siente los movimientos y el médico puede detectar el latido cardiaco del feto	tercer trimestre, se forman depósitos de grasa por debajo de la piel y se pierde vello sedoso
Durante la tercera y cuarta semanas, la cabeza se desarrolla de manera considerable. Se comienza a formar el sistema nervioso	El feto abre sus ojos por primera vez alrededor de la vigésima semana.	Durante el séptimo mes, el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza
3ra y 4ta semana, la cabeza se desarrolla de manera considerable. Se comienza a formar el sistema nervioso central, ojos y orejas.	Vigésimo cuarta semana, es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in utero	Final del octavo mes pesa en promedio, 2 500 gramos y mide 50 cm
La columna vertebral se construye para finales de la cuarta semana.		
"cola" ha desaparecido para la 8va semana		
Decima semana formación de extremidades y uñas		
Finales de la séptima semana, se han formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y gónadas, y ya han empezado a funcionar de manera limitada.		
Al final de la duodécima semana el feto es humano. Mide cerca de 10 centímetros y pesa aproximadamente 19 gramos		

Cambios psicológicos y físicos maternos por trimestre

Primer trimestre (1-3 meses) Fisicos	Segundo trimestre (4-6 meses) Fisicos	Tercer trimestre (7-9 meses) Fisicos
Aumento en niveles hormonales, de estrógeno y progesterona	La mujer se concientiza de los movimientos del feto	El útero es muy grande y duro
Las mamas se inflaman y hormiguean	La mujer se vuelve aún más consciente de su embarazo a causa de su vientre en rápida expansión	Mujeres no pueden conciliar el sueño a causa de sus maromas y eructos.
Los pezones y el área que los rodea (areola) pueden oscurecerse y ampliarse	Estreñimientos y sangrados nasales	Hay presión sobre los pulmones, estómago se oprime y la indigestión se vuelve común. El ombligo se ve empujado hacia fuera. El corazón se encuentra bajo tensión
Necesidad de orinar con mayor frecuencia	Mayor retención de líquidos en todo el cuerpo.	Disminución de energía y el exceso de peso
Náuseas matutinas, sentimientos de náusea, tal vez hasta llegar al vómito, y repulsión hacia la comida o hacia su olor	Líquido amarillo o ámbar llamado calostro salga de los pezones	Útero se constriñe de manera dolorosa
Aumenten los exudados vaginales		músculos uterinos, preparán para el trabajo de parto
Sentimientos de fatiga y sueño		

Cambios psicológicos y físicos maternos por trimestre

Primer trimestre (1-3 meses) psicologicos	Segundo trimestre (4-6 meses) Psicologicos	Tercer trimestre (7-9 meses) Psicologicos
Estados de animosvariado muy feliz a la depresión y el llanto, y de regreso	Un periodo de calma y bienestar relativos	Bienestar psicológico es mayor entre aquellas mujeres que cuentan con un apoyo social
Es irracional y manda a su pareja por comida	Ya han pasado las incomodidades del primer trimestre y las tensiones asociadas con el trabajo de parto	Existe una inconformidad con sus maridos
La depresión	Disminuye lo que es el temor de un aborto espontáneo	Menores niveles de ansiedad e insomnio
La fatiga y la falta de energía	Se sienten con menos probabilidades de depresión	Disminución de energía y el exceso de peso
Ansiedad por preocupación acerca de un aborto espontáneo	Mas angustiadas por las demandas de cuidar a sus otros hijos	
Mujeres que desean el embarazo se encuentran menos ansiosas que las mujeres que no lo desean	Sentimientos de cuidado o de interés materno por el lactante aumentan	
Periodo de felicidad y calma	Creencias culturales de como se deben cuidar durante el embarazo	

Signos durante el embarazo

Presuntivos	Probables	Definitivo
Ausencia de la menstruación.	Prueba inmunológica	Latidos del feto
Sensibilidad, hormigueo o dolor en las mamas	First Response	Movimiento fetal activo
Náusea y vómito	Radioinmunoanálisis beta-hCG	Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido
Micción más frecuente	Fact Plus	
Sensación de fatiga	Answer	
Hay necesidad de dormir más de lo normal	Clear Blue	

Pruebas de detección

Pruebas	Al momento de realizarla
Prueba inmunológica	2 meses despues de última relacion
Radioinmunoanálisis beta-hCG	10 a 14 días después de la concepción
First Response, Fact Plus, Answer y Clear Blue	Medir la presencia de hCG.

Bibliografía:

Janet Shibley Hyde. Sexualidad Humana (9a. Ed.). 2007.