



Wilber Gómez López

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Sexualidad humana

Cuadros comparativos

Tercer Semestre

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre del 2023.

Primer cuadro desarrollo fetal

Primer trimestre

- 3 semana: Es un trozo de carne mide 0.2 cm
- Semana 3 y 4: Empieza a crecer la cabeza, SNC y pueden observarse los inicios de los ojos y orejas
- Final de 4ta semana: Se construye la columna vertebral
- Final de la semana 7: Formación de hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y empieza funcionamiento limitado así como la formación de las gónadas
- 4-8 semana se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies
- Final semana 10: Formación completa de las uñas
- Final semana 12: Toma la forma de lactante y sus medidas son: Mide aproximadamente 10 cm y pesa 19 g

Segundo trimestre

- Final de semana 14: se pueden detectar los movimientos del feto.
- 18 semana: Mujer puede sentir los movimientos y el médico puede detectar el latido cardiaco del feto.
- 20 semana: el feto abre sus ojos por primera vez
- 24 semana: Bebé es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in utero y los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño
- Final del segundo Trimestre la piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.

Tercer trimestre

- 27 semana: se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, se pierde el vello sedoso.
- Durante el mes 7 el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza.
- Final del 8vo mes: en promedio pesa 2 500 gramos (5 libras, 4 onzas).
- Final de mes 8: Pesa 2.5 kg aproximadamente

Segundo cuadro cambios físicos y psicológicos de la madre

Primer trimestre

- Cambios físicos
- Cambios iniciales:
- Cesa la menstruación
- Cambio de temperatura brusco cerca de ovulación y se mantiene elevada (2 semanas)
- Náuseas y vómitos
- Micción frecuente
- Sensación de fatiga
- Necesidad de dormir
- Inflamación y hormigueo de mamas
- Pezones y aréola se amplían y oscurecen
- Exudados vaginales

- Cambios psicologicos
- Ansiedad si el bebé no era deseado y menor si era deseado
- Depresión relacionada a tener recursos bajos

Segundo trimestre

- Cambios fisicos
- Empieza aumento de peso
- Desaparición de síntomas físicos de primer trimestre
- Mujer se concientiza de movimientos fetales
- Notable aumento del vientre
- Posible edema; cara, manos, muñecas, tobillos y pies
- Excreción de calostro

- Cambios psicologicos
- Sientes símbolo de feminidad / torpes y resentida
- Angustia en mujeres con embarazos anteriores
- Aumenta sentimiento de cuidado materno

Tercer trimestre

- Cambios fisicos
- Útero grande y duro
- Dificultad para conciliar el sueño
- Disnea
- Indigestión
- Disminución de energía
- Aumento de volumen sanguíneo
- Continuo aumento de peso
- Contracciones de Braxton-Hicks

- Cambios psicologicos
- Bienestar psicológico en embarazadas con apoyo social/económico

Tercer cuadro Signos presuntivos, probables, y confirmatorios del embarazo y pruebas de detección

Signos presuntivos	Signos probables	Signos confirmatorios
<ul style="list-style-type: none">• Amenorrea• Posibles cambios en el estado de animo• Sensibilidad en las mamas• Náuseas• Micción más frecuente•	<ul style="list-style-type: none">• Prueba inmunológica (presencia de hCG) (8 días después de la concepción)• Radioinmunoanálisis beta-hCG (16 días después de la concepción) • Apartir del primer dia de retraso puede realizarse• Firts Response• Fact Plus• Answer• Clear Blue	<ul style="list-style-type: none">• Latido del corazón fetal• Movimiento fetal activo• Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido

BIBLIOGRAFIA

Rathus, S. A., Nevid, J. S., & Fichner-Rathus, L. (2014). Human sexuality in a world of diversity.