



**Brian Torres Villalobos**

**Dr. Mariana Catalina Saucedo D.**

**Cuadro Comparativo**

**Sexualidad**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Tercer Semestre**

**“C”**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre del 2023.

# Signos presuntivos, probables y confirmatorios del embarazo y pruebas de detección

	SIGNOS PRESUNTIVOS	SIGNOS PROBABLES	SIGNOS CONFIRMATORIOS
¿Qué ocurre?	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Cambios físicos.</li> <li>·Cambios iniciales:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amenorrea.</li> <li>- Posibles cambios en el estado de animo. ①</li> <li>- Sensibilidad en las mamas.</li> <li>- Náuseas.</li> <li>- Micción más frecuente.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Pruebas de laboratorio.</li> <li>-Prueba inmunológica (presencia de hCG) (8 días después de la concepción).</li> <li>- Radioinmunoanálisis beta-hCG (16 días después de la concepción).</li> <li>· Pruebas caceras: (a partir del primer día de retraso puede realizarse).</li> <li>- Clear Blue.</li> <li>- Answer.</li> <li>- Fact plus.</li> <li>- Firts Response.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Latido del corazón fetal.</li> <li>·Movimiento fetal activo.</li> <li>· Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido.</li> </ul>

## Cambios físicos y psicológicos maternos

	PRIMER TRIMESTRE (1-12 semanas)	SEGUNDO TRIMESTRE (13-26 semanas)	TERCER TRIMESTRE (Semana 27-parto)
¿Qué ocurre?	<p>·CAMBIOS FÍSICOS.</p> <p>·Cambios iniciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cesa la menstruación.</li> <li>- Cambio de temperatura brusco cerca de ovulación y se mantiene elevada (2 semanas).</li> <li>- Náuseas y vómitos.</li> <li>- Micción frecuente.</li> <li>- Sensación de fatiga.</li> <li>- Necesidad de dormir.</li> </ul> <p>·Cambios posteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento de niveles hormonales (estrógeno y progesterona).</li> <li>- Inflamación y hormigueo de mamas.</li> <li>- Pezones y aréola se amplían y oscurecen.</li> <li>- Exudados vaginales.</li> </ul> <p>·CAMBIOS PSICOLÓGICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansiedad si el bebé no era deseado y menor si era deseado.</li> <li>- Depresión relacionada a tener recursos bajos.</li> </ul>	<p>·CAMBIOS FÍSICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empieza aumento de peso.</li> <li>- Desaparición de síntomas físicos de primer trimestre.</li> <li>- Mujer se concientiza de movimientos fetales.</li> <li>- Notable aumento del vientre.</li> <li>- Posible edema; cara, manos, muñecas, tobillos y pies.</li> <li>- Posible excreción de calostro</li> </ul> <p>CAMBIOS PSICOLÓGICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sientes símbolo de feminidad / torpes y resentida.</li> <li>- Angustia en mujeres con embarazos anteriores.</li> <li>- Aumenta sentimiento de cuidado materno.</li> </ul>	<p>CAMBIOS FÍSICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Útero grande y duro.</li> <li>- Dificultad para conciliar el sueño.</li> <li>- Disnea.</li> <li>- Indigestión.</li> <li>- Ombligo empujado hacia afuera.</li> <li>- Disminución de energía.</li> <li>- Aumento de volumen sanguíneo.</li> <li>- Continua aumento de peso.</li> <li>- Contracciones de Braxton-Hicks.</li> </ul> <p>CAMBIOS PSICOLÓGICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bienestar psicológico en embarazadas con apoyo social/económico.</li> </ul>

## Desarrollo Fetal

	PRIMER TRIMESTRE (1-12 semanas)	SEGUNDO TRIMESTRE (13-26 semanas)	TERCER TRIMESTRE (Semana 27-parto)
¿Qué ocurre?	<p>Periodo de cambios más notables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•3ra semana: Parece un trozo de carne mide 0.2 cm.</li> <li>•Semana 3 y 4: Empieza a desarrollarse la cabeza, SNC y pueden observarse los inicios de los ojos y orejas.</li> <li>•Final de 4ta semana: Se construye de columna vertebral.</li> <li>•Final de la semana 7: Empieza formación de hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y empieza funcionamiento limitado así como la formación de las gónadas.</li> <li>•4-8va semana se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies.</li> <li>•Final semana 10: Formación completa de las uñas.</li> <li>•Final semana 12: Toma la forma de lactante y sus medidas son : Mide aprox 10 cm y pesa 19 g.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Final de semana 14: se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento).</li> <li>•Semana 18: Mujer puede sentir los movimientos y el médico puede detectar el latido cardiaco del feto.</li> <li>•20 semana: el feto abre sus ojos por primera vez.</li> <li>•Semana 24: Bebé es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in utero y los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño.</li> <li>•Final del segundo Trimestre: la piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Semana 27: se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, se pierde el vello sedoso.</li> <li>•Durante mes 7 : el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza.</li> <li>•Final del 8vo mes: en promedio pesa 2 500 gramos (5 libras, 4 onzas).</li> <li>•Final de mes 8: Pesa 2.5 kg aproximadamente</li> <li>Bebé a término: en promedio pesa 3 300 gramos (7.5 libras) y mide 50 cm (20 pulgadas).</li> </ul>

Rathus, S. A. Nevid, J. S. Y Fichner – Rathus, L. (2004). Humano sexuality in a world of diversity