



Anan Villatoro Jiménez

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Sexualidad humana

Cuadros comparativos

Tercer Semestre

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre del 2023.

DESARROLLO FETAL

PRIMER TRIMESTRE (1-12 semanas)

Periodo de cambios más notables

- 3ra semana: Parece un trozo de carne mide 0.2 cm
- Semana 3 y 4: Empieza a desarrollarse la cabeza, SNC y pueden observarse los inicios de los ojos y orejas
- Final de 4ta semana: Se construye de columna vertebral
- Final de la semana 7: Empieza formación de hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y empieza funcionamiento limitado así como la formación de las gónadas
- 4-8va semana se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies
- Final semana 10: Formación completa de las uñas
- Final semana 12: Toma la forma de lactante y sus medidas son : Mide aprox 10 cm y pesa 19 g

SEGUNDO TRIMESTRE (13-26 semanas)

- Final de semana 14: se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento).
- Semana 18: Mujer puede sentir los movimientos y el médico puede detectar el latido cardiaco del feto.
- 20 semana: el feto abre sus ojos por primera vez
- Semana 24: Bebé es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in utero y los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño
- Final del segundo Trimestre: la piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.

TERCER TRIMESTRE (Semana 27-parto)

- Semana 27: se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, se pierde el vello sedoso.
- Durante mes 7 : el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza.
- Final del 8vo mes: en promedio pesa 2 500 gramos (5 libras, 4 onzas).
- Final de mes 8: Pesa 2.5 kg aproximadamente
- Bebé a término: en promedio pesa 3 300 gramos (7.5 libras) y mide 50 cm (20 pulgadas)

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS

PRIMER TRIMESTRE (1-12 semanas)	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
<p>CAMBIOS FÍSICOS</p> <p>Cambios iniciales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cesa la menstruación• Cambio de temperatura brusco cerca de ovulación y se mantiene elevada (2 semanas)• Náuseas y vómitos• Micción frecuente• Sensación de fatiga• Necesidad de dormir <p>Cambios posteriores:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aumento de niveles hormonales (estrógeno y progesterona)• Inflamación y hormigueo de mamas• Pezones y aréola se amplían y oscurecen• Exudados vaginales <p>CAMBIOS PSICOLÓGICOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Ansiedad si el bebé no era deseado y menor si era deseado• Depresión relacionada a tener recursos bajos	<p>CAMBIOS FÍSICOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Empieza aumento de peso• Desaparición de síntomas físicos de primer trimestre• Mujer se concientiza de movimientos fetales• Notable aumento del vientre• Posible edema; cara, manos, muñecas, tobillos y pies• Posible excreción de calostro <p>CAMBIOS PSICOLÓGICOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Sientes símbolo de feminidad / torpes y resentida• Angustia en mujeres con embarazos anteriores• Aumenta sentimiento de cuidado materno	<p>CAMBIOS FÍSICOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Útero grande y duro• Dificultad para conciliar el sueño• Disnea• Indigestión• Ombligo empujado hacia afuera• Disminución de energía• Aumento de volumen sanguíneo• Continua aumento de peso• Contracciones de Braxton-Hicks <p>CAMBIOS PSICOLÓGICOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Bienestar psicológico en embarazadas con apoyo social/económico•

SIGNOS PRESUNTIVOS, PROBABLES, Y CONFIRMATORIOS DEL EMBRAZO Y PRUEBAS DE DETECCIÓN

SIGNOS PRESUNTIVOS	SIGNOS PROBABLES (PRUEBAS)	SIGNOS CONFIRMATORIOS
<p style="text-align: center;">CAMBIOS FÍSICOS</p> <p>Cambios iniciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amenorrea • Posibles cambios en el estado de animo • Sensibilidad en las mamas • Náuseas • Micción más frecuente 	<p style="text-align: center;">Prueba de laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prueba inmunológica (presencia de hCG) (8 días después de la concepción) • Radioinmunoanálisis beta-hCG (16 días después de la concepción) <p>Pruebas caceras: (apartir del primer dia de retraso puede realizarse)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firts Response • Fact Plus • Answer • Clear Blue 	<ul style="list-style-type: none"> • Latido del corazón fetal • Movimiento fetal activo • Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido

BIBLIOGRAFIA

Rathus, S. A., Nevid, J. S., & Fichner-Rathus, L. (2014). Human sexuality in a world of diversity.