



Luis Alberto Ballinas Ruiz

**Dra. Mariana Catalina Saucedo
Domínguez**

Cuadro comparativo

Sexualidad Humana

3°

“C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de octubre de 2023.



Desarrollo Fetal

Primer Trimestre. (1-12 semanas)	Segundo Trimestre. (13-26 semanas)	Tercer Trimestre. (Semana 27 al parto)
<ul style="list-style-type: none">• En la 3ra semana: Parece un trozo de carne mide 0.2 cm• En la semana 3 y 4: Comienza a desarrollarse la cabeza, el SNC y pueden observarse los inicios de los ojos y orejas.• En el final de la 4ª semana: Se construye de columna vertebral.• Final de la semana 7: Empieza formación de hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y empieza funcionamiento limitado así como la formación de las gónadas.• En la 4ª a la 8ª semana se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies.• Al final de la semana 10: Formación completa de las uñas• Al final de la semana 12: Toma la forma de lactante y sus medidas son : Aproximadamente de 10 cm y pesa 19 g	<ul style="list-style-type: none">• Final de semana 14: Se pueden detectar o presenciar los movimientos del feto (avivamiento).• En la semana 18: La mujer puede sentir los movimientos y el médico puede detectar el latido cardiaco del feto.• En la semana 20: El feto abre por primera vez sus ojos .• En la semana 24: El bebé es sensible a la luz y puede escuchar sonidos en útero y los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño.• Final del segundo trimestre: la piel del feto se encuentra arrugada y cubierta de un vello sedoso.	<ul style="list-style-type: none">• En la semana 27: Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, para después perderse el vello sedoso.• En el séptimo mes: El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza.• Al final de octavo mes: En promedio el bebé pesa 2,500 gr (5 libras, 4 onzas).• El bebé a término: En promedio pesa 3,300 gr (7.5 libras) y llega a medir 50 cm (20 pulgadas).

Cambios físicos y psicológicos maternos

Primer Trimestre. (1-12 semanas)	Segundo Trimestre. (13-26 semanas)	Tercer Trimestre. (Semana 27 al parto)
<p>CAMBIOS FÍSICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesa la menstruación. • Cambio de temperatura brusco cerca de la ovulación y se mantienen elevada hasta 2 semanas. • Náuseas y vómitos. • Micciones frecuentes. • Sensación de fatiga. • Necesidad de dormir. • Aumento de niveles hormonales (estrógeno y progesterona). • Inflamación y hormigueo de mamas. • Los pezones y laaréola se amplían y oscurecen. • Exudados vaginales. 	<p>CAMBIOS FÍSICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empieza aumento de peso. • Desaparición de síntomas físicos de primer trimestre. • Mujer se concientiza de movimientos fetales. • Notable aumento del vientre. • Posible edema; cara, manos, muñecas, tobillos y pies. • Posible excreción de calostro. 	<p>CAMBIOS FÍSICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Útero grande y duro. • Dificultad para conciliar el sueño. • Disnea. • Indigestión. • Ombligo empujado hacia afuera. • Disminución de energía • Aumento de volumen sanguíneo. • Continua aumento de peso. • Contracciones de Braxton-Hicks.
<p>CAMBIOS PSICOLÓGICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presencia de ansiedad si el bebé no era deseado y menor si, sí era deseado. • Depresión relacionada a presentar bajos recursos. 	<p>CAMBIOS PSICOLÓGICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sientes símbolo de feminidad / torpes y resentida • Angustia en mujeres con embarazos anteriores • Aumenta sentimiento de cuidado materno 	<p>CAMBIOS PSICOLÓGICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bienestar psicológico en embarazadas con apoyo social/económico

Signos presuntivos, probables y confirmatorios del embarazo y pruebas de detección.

Signos presuntivos	Signos probables (Pruebas)	Signos confirmatorios
<ul style="list-style-type: none">• Amenorrea• Posibles cambios en el estado de animo• Sensibilidad en las mamas• Náuseas• Micción más frecuente	<ul style="list-style-type: none">• PRUEBA DE LABORATORIO Prueba inmunológica (presencia de hCG) (8 días después de la concepción). Radioinmunoanálisis beta-hCG (16 días después de la concepción).• PRUEBAS CASERAS First Response Fact Plus Answer Clear Blue	<ul style="list-style-type: none">• Latido del corazón fetal• Movimiento fetal activo• Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido.

Bibliografía

- Janet Shibley Haydee, J. D. (2006). Sexualidad Humana, 9ª edición. México: Mc Graw Hill