

Nombre del alumno: Hania Paola Domínguez Franco.

Nombre del profesor: Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez.

Nombre del trabajo: Cuadro comparativo.

Materia: Sexualidad humana.

Grado: 3

Grupo: C

Desarrollo fetal.

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre
<p>3ra semana. El embrión mide 0.2 cm</p> <p>3ra y 4ta semana. Desarrollo de la cabeza considerable. Se comienza a formar el SNC. Inicios de ojos y orejas.</p> <p>Finales de la 4ta semana. Construcción de la columna vertebral.</p> <p>Finales de la 7ma semana. Se ha formado el hígado, páncreas, riñones, e intestino, con función limitada y las gónadas.</p> <p>4ta a la 8va semana. Desarrollo de las partes corporales externas: Ojos orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies.</p> <p>8va semana . Desaparición de la “cola ”del embrión.</p> <p>Final de la 10a semana. Conjunto completo de dedos. Tiene uñas.</p> <p>12 semana. Parece un pequeño lactante. Mide 10 cm. Pesa 19 gramos.</p>	<p>Final de la 14ta semana. Detección de movimientos (avivamiento).</p> <p>18va semana. La mujer ha podido sentir los movimiento por 2-4 semanas. El médico puede detectar el latido cardiaco.</p> <p>20ma semana. El feto abre por primera vez los ojos.</p> <p>24ta semana. Es sensible a la luz. Puede detectar sonidos in útero. Movimientos de brazos y piernas son vigorosos. Feto con periodos de vigilia y sueño.</p>	<p>Final de la semana 24. La piel del feto esta arrugada. Cubierta de vello seroso.</p> <p>Inicio del tercer trimestre. Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel. Se pierde el vello seroso.</p> <p>7mo mes. El feto rota dentro del útero. Asume la posición de cabeza (si no ocurre en el momento del parto, habrá una presentación de nalgas).</p> <p>Final del 8vo mes. Pesa en promedio 2,500 gramos.</p> <p>El bebé a término pesa 3,300 gramos. Mide 50 cm.</p>

Cambios físicos y psicológicos.

<u>Primer trimestre</u>		<u>Segundo trimestre.</u>		<u>Tercer trimestre.</u>	
Cambios físicos	Cambios psicológicos	Cambios físicos	Cambios psicológicos	Cambios físicos	Cambios psicológicos
1. Aumento de niveles hormonales	1. Períodos emocionales.	1. La mujer se concientiza del avivamiento.	1. Período de calma y bienestar relativos.	1. El útero es muy grande y duro	1. Los mismos que en el trimestre anterior.
2. Las mamas se inflaman y hormiguean	2. Depresión.	2. Aumento de peso.	2. Disminución del temor de aborto espontáneo.	2. No pueden conciliar el sueño a causa de sus maromas y eructos	2. Bienestar psicológico con apoyo social.
3. Los pezones y la areola se oscurecen y se amplían.	3. Ansiedad.	3. Expansión rápida del vientre.	3. Menos posibilidades de depresión.	3. Presión en los pulmones que causa falta de respiración	3. Menos sucesos estresantes concurrentes.
4. Necesidad de micción frecuente	4. Inquietud	4. Desaparecen los síntomas físicos del 1er trimestre.	4. Mujeres con embarazos anteriores. Angustiadas	4. Oprime el estómago, causa indigestión	
5. Expansión del útero.		5. Estreñimiento.	5. Sentimientos de cuidado e interés materno.	5. En el corazón, causa aumento en el volumen sanguíneo.	
6. Aumento de exudado vaginal.		6. Epistaxis.		6. Disminución de energía	
7. Fatiga		7. Edema (cara, manos, muñecas, tobillos, pies).		7. Continuo aumento de peso	
8. Sueño.		8. Han completado el desarrollo en preparación del amamantamiento.		8. "Caminado de pato"	
9. Náuseas		9. 19na semana. Calostro.		9. Contracciones de Braxton-Hicks	
10. Vómito				10. El bebé rota y la cabeza desciende a la pelvis.	

Signos presuntivos, signos probables y signos confirmatorios.

Signos presuntivos	Signos probables		Signos confirmatorios.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Amenorrea. 2. Sensibilidad en las mamas. 3. Sensación de hormigueo. 4. Micción frecuente. 5. Náuseas. 6. Vómito. 7. Sangrado. 8. Aumento de temperatura. 9. Fatiga. 10. Necesidad mayor de dormir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de hCG. 	7 días después de la implantación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latido del corazón fetal. 2. Movimiento fetal activo. 3. Detección del esqueleto fetal a través de ultrasonido.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Radioinmunoanálisis beta-hCG. 	7 días después de la fertilización.	
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pruebas caseras de embarazo (First Response, Fact Plus, Answer y Clear Blue) 	Después del primer día de amenorrea.	

Bibliografía.

Hyde, J. S., & DeLamater, J. D. (2006b). *Sexualidad humana* (9.^a ed.). Ricardo A. del Bosque Alayón.