



Universidad del sureste

Licenciatura de medicina humana

Crecimiento y Desarrollo

Asesora: Dra rosvani Margine Morales

Flash Cards de los temas:

- **Factores que regulan el crecimiento**
- **Periodos de crecimiento y desarrollo**
 - **Perfil TORCH**
 - **NOM-007-SSA2-2016**


Alumno: Lupita Melaine Toledo Alfaro

Medicina humana

DESARROLLO

POSTNATAL

- Lactancia 28 días y 2 años.
- primera infancia 0 - 6 años
- segunda infancia 6 años - 12 años
- Pubertad 10-14 niñas
12-16 niños
- Adolescencia
- Madurez
- Vejez




Agrega tiempo a las etapas.


poòTNIA-ra



PERIODO
GERMINAL
O ZIGOTICO



PERIODO
EMBRIONARIO



PERIODO
FETAL

PSICOSOCIALES




- * ESTIMULACIÓN
- * AFECTIVIDAD
- * NORMAS DE CRIANZA
- * FACTORES CULTURALES Y SOCIOECONÓMICOS DE LA FAMILIA.



FASES DE LA ETAPA PRENATAL



PERIODO
GERMINAL
O ZIGOTICO




PERIODO
EMBRIONARIO



PERIODO
FETAL

PSICOSOCIALES



- * ESTIMULACIÓN
- * AFECTIVIDAD
- * NORMAS DE CRIANZA
- * FACTORES CULTURALES Y SOCIOECONÓMICOS DE LA FAMILIA.





BoowQõCos

FACTORES GENÉTICOS

- GENOTIPO Y SEXO FETALES
- GENOTIPOS MATERNO Y PATERNO

FACTORES PRENATALES

- ENFERMEDADES CRÓNICAS
 - HIPERTENSIÓN ARTERIAL,
DIABETES GESTACIONAL,
ENFERMEDAD VASCULAR,
OBESIDAD, I.R., ENTRE OTRAS.
-

FACTORES PERINATALES

- PREMATURIDAD, BAJO PESO
AL NACER.
 - HIPOXIA PERINATAL.
 - INFECCIONES INTRAUTERINAS.
DROGAS.
 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS
 - ENFERMEDAD HEREDITARIA.
 - USO DE MEDICAMENTOS.
-

FACTORES POSTNATALES

- CORRESPONDEN A LOS RIESGOS POSIBLES
- LUGAR DE LA ETAPA PERINATAL Y NEONATAL.
- FACTORES QUE LUEGO DEL NACIMIENTO PUEDEN INFLUIR NEGATIVAMENTE (ALTERACIONES CEREBRALES)

Escaneado con CamScanner

TOXOPLASMOSIS

- calcificaciones intracraneales
- hidrocefalia
- Coriorretinitis
- pleocitosis en LCR.

Otros (Sifilis)

- Anomalías Esqueléticas
- Seudoparálisis
- Vinitis persistente
- Erupción maculopapular.

RUBEOLA

- cataratas, glaucoma congénitos
- Retinopatía pigmentaria
- Enfermedad Cardíaca congénita
- hipoaousia.

CITOMEGALOVIRUS

- Trombocitopenia
- calcificaciones intracraneales
- Alporcefalia
- Hepatoesplenomegalia
- hipoaousia

HERPES SIMPLE

- Vesículas mucocutáneas
- pleocitosis en LCR
- Trombocitopenia
- Anomalías Oculares
- Anomalías Cerebrales.

RUBÉOLA

Dx: Determinación del Estado Inmuno: en mujeres en edad gestacional, previo al Embarazo. Titulos Mayores de 1:8 indica protección.

Tx: Embarazadas sin conocimiento del estado inmune: a) embarazada con diagnóstico de rubéola: necesario dos muestras de suero antes y después del Exantema. Confirmar IgM a infección primaria. B) Embarazada con contacto con paciente con rubéola. Sin riesgo probable. Hacer IgM para confirmar o descartar primo infección.

CITOMEGALOVIRUS

Dx: Cultivos de muestras de Saliva, Orina y Tejido para hacer el conteo de la carga viral, cultivo

Tx: Tejido amniótico.

Los antivirales empleados inhiben la síntesis del DNA del virus actuando a nivel de la DNA polimerasa, entre estos: ganciclovir, foscarnet y cidofovir.

Perfil de torch

¿QUÉ ES?

Es un examen de sangre que evalúa la presencia de infecciones por:

Toxoplasmosis, Rubéola, Citomegalovirus, Herpes Simple (TORCH).

TORCH

Es la agrupación de cinco infecciones perinatales con presentaciones clínicas simples.

Toxoplasmosis
Toxoplasma gondii

Otros (sífilis)
Treponema pallidum

Rubéola

Citomegalovirus

Herpes Simple

CONTROL PRECONCEPCIONAL

El control preconcepcional, control prenatal y la atención del parto y posparto, buscan que la madre y el neonato no sufran eventos adversos y que así la atención neonatal otorgada sea de buena calidad.

▲ CONSULTA PRECONCEPCIONAL

Es un proceso que inicia con la anamnesis que se realiza a la usuaria antes de la concepción, para detectar, corregir o disminuir factores de riesgo.
Se realiza atención primaria de la Salud (APS)



• OBJETIVOS DE LA ATENCION

Identificar factores (hábitos, conductas, patologías, etc).
promocionar acciones y orientar a la pareja o usuaria.

• CONSEJERIA PRECONCEPCIONAL

Se debe establecer una relación cordial, identificar necesidades de la usuaria, identificar factores de riesgo y factores protectores, entregar información, responder dudas y aconsejar.

ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL

- Son intervenciones que identifican condiciones (biológicas, hábitos, comportamientos,) que puede convertirse en riesgo.

FACTORES DE RIESGO REPRODUCTIVO

- **psicosocial**: violencia, bajo ingreso económico, tabaquismo, alcoholismo, drogas, violencia intra-familiar, baja educación sexual y actividad física.
- **biológica**: Edad extremas (<15-35<), peso mltipara >4 enfermedades crónicas, patologías obstétricas ITS.