



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
LIC. EN MEDICINA HUMANA**



FLASH CARDS

MATERIA: CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ALUMNA: DULCE MARIANA SANTIZ BALLINAS

3ER. SEMESTRE

3RO. D

NOMBRE DEL DOCENTE: DRA. ROSVANI MARGINE

MORALES IRECTA

Tratamiento: No hay tratamiento
• Aislamiento

TORCH

Detecta

Toxoplasmosis

Otras infecciones

Rubéola

Citomegalovirus

Herpes Simple

Para = Mujeres que planean embarazarse

• Mujeres embarazadas


• Recién nacido

se sospecha riesgo de transmisión de toxoplasmosis a se sospecha riesgo de transmisión de toxoplasmosis ante débil Du y la prueba de anticuerpos de toxoplasmosis

Toxoplasmosis

TORCH

• Una infección debido al parásito **Toxoplasma Gondii**.



Causas → Transfusiones de sangre o trasplante de órganos sólidos

→ Manejo de los excrementos de gato

→ Ingerir tierra contaminada

→ Comer carne cruda o mal cocida

La toxoplasmosis también afecta a personas con **defensas bajas** y también de **madre infectada** a su **bebé** por medio de la **placenta**.

Físicas ↓

Cabeza y Cara = Tamaño, forma, fontanelas etc

Ojos = Presencia, tamaño...

Oídos = Tamaño, forma, simetría

Nariz = Permeabilidad de fosas nasales

Cuello = Movilidad y presencia

Cardiovascular = Frecuencia y ritmo cardíaca

Abdomen = forma, volumen...

Genitales = Anomalías

Ano = localización

7a Consulta - 36 semanas

8a Consulta - 38 - 41 Semanas

Consulta Preconcepcional

- > Promover la salud de la mujer y descendencia
- > La Salud de la mujer

objetivo Principal =

- Medidas Preventivas
- Personal de salud > aconsejar y orientar

- Historia Clínica
- Valoración por servicio
- Acido fólico $\left\{ \begin{array}{l} 3 \text{ meses antes} \\ \text{o después del} \\ \text{embarazo} \end{array} \right.$

2- Hiperplasia suprarrenal Congenita HSC

- > Afecta glándulas suprarrenales
- > No hay suficiente cortisol
aldosterona
- > Hay más androgeno

Clínica → - Poco apetito
- Vomito
- Sueño - Pérdida de peso
- Diarrea
- Deshidratación

3- Galactosomía

- > No metaboliza el azúcar

Clínica → - Convulsión
- Irritabilidad - Letargo
- Ictericia - Vomito

Tx = Calcio, suplemento

- Leche maternizada libre de lactosa

4- Fenilcetonuria **PKU**

> No hay descomposición del fenilalanina

Clinica →

- Hiperactividad
- Microcefalia
- Convulsión
- Erupción Cutánea
- Discapacidad mental

Tx =

Dieta baja de fenil

- Consumo de leche en polvo

Consulta Prenatal

Como mínimo 5 consultas prenatales

- > Permite detectar riesgos fetales y maternos
- > Permite aclarar dudas, sobre todo a mamás primerizas

1ª Consulta - 6-8 Semanas

2ª Consulta - 10-13.6 Semanas

3ª Consulta - 16-18 Semanas

4ª Consulta - 22 Semanas

5ª Consulta - 28 Semanas

6ª Consulta - 32 Semanas

TAMIZ

Metabólico Neonatal

- Toma de muestra de sangre del talón → 2-5 días después del nacimiento

1: Hipotiroidismo congénito

- > Afecta al desarrollo y crecimiento
- > No hay producción de hormonas por la TSH

- Clinica →
- Bajo tono muscular
 - Cansancio
 - Poca energía
 - Hipotermia
 - Estreñimiento

Atención del recién nacido

- > Implica asistencia en el momento, junto con con la consulta de los 3-5 días después del parto.

- Incluye →
- Atención Obstétrica
 - Reanimación neonatal (si es necesaria)

NOM-007

SSA2-2016

- Manejo del cordón Umbilical
- Prevención de cuadros hemorrágicos
K1 mg
- Tamiz = 72 horas de vida
- Examen físico

