



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Debora Mishel Trujillo Liévano

Nombre del tema: cuadros comparativos

Parcial: 2

Nombre de la Materia: sexualidad humana

Nombre del profesor: Saucedo Domínguez Mariana Catalina

Nombre de la Licenciatura: medicina

Cuatrimestre: 3

| semanas | Primer trimestre | semanas | Segundo trimestre | Semanas | Tercere trimestre |
|--------------------------------|--|-----------------|--|--------------|--|
| |  | |  | |  |
| General | el desarrollo del feto durante el primer trimestre es más notable que su desarrollo durante el segundo y el tercero | Décimo cuarta | -se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento). | general | -segundo trimestre, la piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso. - Al principio del tercer trimestre, se forman depósitos de grasa por debajo de la piel; estos le darán al lactante la característica apariencia regordeta de los bebés. Se pierde el vello sedoso. |
| Tercera semana | -el embrión mide cerca de 0.2 centímetros -la cabeza se desarrolla de manera considerable. | Decimo octava | -la mujer ha podido sentir los movimientos durante dos a cuatro semanas - el médico puede detectar el latido cardiaco del feto. | Séptimo, mes | -el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza |
| Tercera y Cuarta semana | -la cabeza se desarrolla de manera considerable. -Se comienza a formar el sistema nervioso central - se pueden observar los inicios de ojos y orejas. --La columna vertebral se | Vigésima semana | -El feto abre sus ojos por primera vez alrededor de la vigésima semana | Octavo | Al final del octavo mes pesa, en promedio, 2 500 gramos (5 libras, 4 onzas). El bebé promedio a término pesa 3 300 gramos (7.5 libras) y mide 50 centímetros (20 pulgada) |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| | construye para finales de la cuarta semana. | | | | |
| Cuarta y octava semana | -se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazo -manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies. | Vigésimo cuarta | -es sensible a la luz - puede escuchar sonidos en útero. -los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño. | | |
| Octava semana | -la cola desaparece | | | | |
| Séptima semana | -se forma el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino, y ya han empezado a funcionar de manera limitada. -se han formado las gónadas, | | | | |
| Decima semana | -Para el final de la décima semana, el embrión no sólo tiene un conjunto completo de dedos, sino que también tiene uña | | | | |
| Duodécima semana | -se distingue con claridad el sexo del feto - el feto es indudablemente humano - parece un pequeño lactante. -Mide cerca de 10 centímetros (4 pulgadas) | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <p>-pesa aproximadamente 19 gramos (2/3 de onza).</p> <p>-A partir de este momento, el desarrollo consiste principalmente del crecimiento y diferenciación de estructuras que ya se encuentran presentes.</p> | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

Desarrollo fetal por trimestre

| | fisico | psicologico |
|---|--|--|
| Primer trimestre  | <ul style="list-style-type: none"> -un elevado aumento en niveles hormonales, en especial de estrógeno y progesterona, producidos por la placenta - Las mamas se inflaman y hormiguean. - Los pezones y el área que los rodea (areola) pueden oscurecerse y ampliarse. - De manera habitual existe una necesidad de orinar con mayor frecuencia - Algunas mujeres experimentan náuseas matutinas, sentimientos de náusea, tal vez hasta llegar al vómito, y repulsión hacia la comida o hacia su olor. - sentimientos de fatiga y sueño -aumento de exudados | <p>Pueden estar felices o entrar en una depresión pero para eso se evalúan tres factores</p> <ul style="list-style-type: none"> -actitud al embarazo y economía - la depresión no es inusual en esta época - Durante este trimestre, es frecuente que las ansiedades de las mujeres se centren alrededor de preocupaciones acerca de un aborto espontáneo |
| Segundo trimestre  | <ul style="list-style-type: none"> - Durante el cuarto mes, la mujer se concientiza de los movimientos del feto (avivamiento). Muchas mujeres encuentran que ésta es una experiencia muy emocionante - La mujer se vuelve aún más consciente de su embarazo a causa de su vientre en rápida expansión - Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre, tales como náuseas matutinas, y las incomodidades se minimizan. -estreñimientos y sangrados nasales -retención de líquido e inflamación en cara, manos, muñecas, tobillos y pies; - calostro - las mamas, a causa de la estimulación hormonal, esencialmente han completado su desarrollo en preparación del amamantamiento | <ul style="list-style-type: none"> -periodo de calma y bienestar relativos - Disminuye el temor de un aborto espontáneo a medida que la mujer siente los movimientos del feto - Existen menos probabilidades de depresión durante el segundo trimestre si la mujer tiene una pareja o esposo que cohabite con ella - las mujeres que han tenido embarazos anteriores se encuentran más angustiadas durante esta época que las mujeres que no los han tenido - los sentimientos de cuidado o de interés materno por el lactante aumentan progresivamente desde el periodo anterior al embarazo y el posparto -las creencias de la mujer acerca del embarazo y acerca de cómo se debería comportar durante el mismo están bajo influencias culturales. |

Tercer trimestre



- el útero es muy grande y duro.
- Cada vez más, la mujer se percata de su tamaño y del tamaño del feto
- El tamaño extremo del útero ejerce presión sobre otros órganos, lo que ocasiona cierta incomodidad.
- Hay presión sobre los pulmones, lo que puede causar falta de respiración.
- El estómago también se oprime y la indigestión se vuelve común
- El ombligo se ve empujado hacia fuera.
- El corazón se encuentra bajo tensión a causa del considerable aumento en volumen sanguíneo.
- Durante esta etapa la mayoría de las mujeres siente una disminución de energía
- aumento de peso del segundo trimestre continuo
- dolores de espalda
- El equilibrio de la mujer se encuentra ligeramente trastornado debido a la gran cantidad de peso que se ha añadido a la parte frontal de su cuerpo.
- contracciones

- El bienestar psicológico es mayor entre aquellas mujeres que cuentan con un apoyo social, madres que pertenecen a la clase social media, y que experimentan menos sucesos vitales estresantes concurrentes.
- las madres primerizas informaban de un aumento significativo en la inconformidad con sus maridos del segundo al tercer trimestre
-

cambios físicos y psicológicos maternos por trimestre

| Signos probables | Signos presuntivos | Signos confirmatorios |
|---|---|---|
| <p>-amenorreas -signos vulvovaginales - signos uterinos -PRUEBA INMUNOLOGICA (+) -.CHADWICK -GOODELL -GONADOTROFINA DETECTABLE APARTIR DEL 8 A 11 DIAS >25mUI/ml</p> | <p>-Digestivo: Náuseas, vómitos, sialorrea, estitiquez. -Nervioso: Somnolencia, irritabilidad, labilidad emocional, insomnio, fatigabilidad, apetito caprichoso, aversión a ciertos olores -Urinario: Polaquiuria -Mamas: Tensión, sensibilidad, calostro, corpúsculos de Montgomery (glándulas peri areolares), pigmentación pezón y areola, red venosa aumentada, estrías. -Abdomen: Aumento de volumen, línea parda, aumento de vello -Extremidades Inferiores: Dilatación venosa, várices.</p> | <p>(1) latido del corazón fetal (2) movimiento fetal activo (3) detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido.</p> |

Bibliografía

hyde, j. s. (2006). *sexualidad humana* . mexico : Mc graw hil.