



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE.
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA.
CAMPUS COMITAN DE DOMINGUEZ.**

Asignatura: Sexualidad.

Catedrático: Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez.



Semestre: 3er Semestre Grupo "D"


- Pérez Nuricumbo Yereni Monserrat

Cuadro comparativo

Enfermedad	Definición	Factores epidemiológicos	Clasificación	Cuadro clínico	Diagnostico	Tratamiento	Imagen
SIFILIS	Es una infección bacteriana causada por <i>Treponema pallidum</i> que da lugar a una morbilidad y mortalidad sustanciales	-Drogas Distribución mundial. -Hombres homosexuales suelen verse afectados de manera desproporcionada	Sifilide maculosa o roséola sifilítica. Sifilide papulosa. Sifilide papulocostrosa. Sifilide papulo escamosa.	-chancro, erupción cutánea, mayormente en palmas de las manos y plantas de los pies. Úlceras llamadas parches mucosos en o alrededor de la boca, la vagina o el pene.	La sífilis se puede diagnosticar mediante el análisis de muestras de: 1. Sangre. Los análisis de sangre pueden confirmar la presencia de anticuerpos.	Penicilina procaínica usar 1.2 millones de UI, IM cada 24 hrs * 20 días. penicilina benzatínica aplicar 2.4 millones de UI, IM una sola dosis.	

Herpes simple	Virus herpes simple I y II familia de los Herpesviridae	mundial, afecta a todas las razas y a ambos sexos, se presenta a cualquier edad.	VHS-1 afecta rostro, VHS-2 afecta a los genitales.	Estomatitis: gingivo estomatitis herpética, herpes labial. Genital. Vulvo vaginitis y balanitis herpética. Otros. proctitis herpética y herpes perianal.	Vesículas agrupadas sobre una base eritemato o úlceras pequeñas con la misma disposición, precedidas de ardor y prurito, así como la historia de recurrencia, son suficientes para efectuarlo, en otros casos biopsia o citodiagnóstico de Tzanck(tienza).	aciclovir 200 mg 5 veces al día, famciclovir 250 mg, c/8 horas o 1 g de valaciclovir cada 12 hrs.	
LINFOGRANULOMA VENÉREO	Es una enfermedad causada por 3 únicas cepas de chlamydia trachomatis	Se encuentra en Asia, África, el Caribe y Golfo de México, >hombre. Forma crónica en mujeres.	causada por los serotipos L1, L2 y L3	la lesión primaria, que puede iniciar como pápula, vesícula herpetiforme o pequeña erosión, dura poco y es asintomática. 2da etapa adenitis inguinal unilateral, comienza la inflamación local, aumento de volumen se palpa un ganglio duro, un tanto engastado en la mayoría de los casos no es doloroso o sólo un poco al caminar o a la palpación	examen directo del exudado de las lesiones o del pus extraído por punción del bubón, en los cuales (mediante la tensión de Giemsa). El método más sensible y específico es la titulación de anticuerpos fluorescentes de las pruebas ELISA y PCR.	doxiciclina 100 mg cada 12 hrs, 500 mg de tetraciclina cada 6 h.	 Linfogranuloma Venereo
GRANULOMA INGUINAL	El granuloma inguinal es una infección progresiva de la piel genital y perineal causada por Klebsiella (antes denominado Calymmatobacterium) granulomatis.	frecuencia en países subtropicales y tropicales, predomina en varones.		periodo de incubación de 3 a 40 días. inicia con una pápula firme o nódulo no tan firme que crece con rapidez y forma una úlcera de bordes bien definidos, lisos y elevados, su fondo tiene tejido granulomatoso, eritematoso, que sangra con facilidad.		la tetraciclina 500 mg cada 6 h durante 3 semanas. Mujeres embarazadas se utiliza eritromicina 500 mg cada 6 h por 2 semanas.	
CHANCROIDE	Es la infección de la piel o las mucosas genitales causada por el Haemophilus ducreyi.						 Chancroide Genital

CITOMEGA LOVIRUS	<p>Es un tipo del virus del herpes. Todos los virus del herpes permanecen en el cuerpo durante toda la vida después de la infección.</p>	<p>Distribución mundial.</p>					
GONORREA VAGINAL	<p>Es una infección de transmisión sexual frecuente causada por una bacteria.</p>						
CLAMIDIAS VAGINAL	<p>Es una infección de transmisión sexual frecuente que puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. Es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis.</p>						
TRICOMONIASIS VAGINAL	<p>Es una infección sexual causada por el protozoo Trichomonas vaginalis, que puede causar vaginitis en las mujeres.</p>						<p>Flujo Vaginal Tricomonas</p> 
VAGINOSIS BACTERIANA	<p>La vaginosis bacteriana es una infección vaginal causada por la proliferación anormal de bacterias naturales de la vagina, como Gardnerella.</p>						<p>VAGINOSIS BACTERIANA</p>  <p>Mg. Julia J. García Mendoza BIÓLOGA - MICROBIÓLOGA</p>

MICOSIS VAGINAL	<p>Una infección por hongos vaginales es una infección micótica que provoca irritación, flujo e intensa picazón en la vagina y la vulva, los tejidos que se encuentran en la apertura vaginal.</p>						
EPI	<p>La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección polimicrobiana del tracto genital femenino superior: el cuello uterino, el útero, las trompas uterinas o de Falopio.</p>						
CONDILOMAS ACUMINADOS Y PLANOS	<p>Los condilomas acuminados son producidos por el virus del HPV y los condilomas planos corresponden a un sífilis secundaria.</p>						
INFECCIÓN POR VIRUS DE HEPATITIS C	<p>Es una infección vírica que causa inflamación del hígado, lo que a veces conduce a un daño hepático grave.</p>						

VIH	<p>(virus de la inmunodeficiencia humana) Es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo.</p>						
SIDA	<p>El SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH. El VIH ataca y destruye las células CD4 (linfocitos CD4) del sistema inmunitario que combaten las infecciones.</p>	<p>No utilizar preservativos</p>		<p>Algunos síntomas; Fiebre. Fatiga. Ganglios linfáticos inflamados: aumento, uno de los primeros signos de la infección por el VIH . Diarrea. Pérdida de peso. Candidiasis vaginal (candidiasis) Herpes (herpes zóster) Neumonía.</p>			

Bibliografía

OMS. (31 de MAYO de 2023). Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/syphilis>

De Montis, I. A. (2008). *Sexualidad humana*. sexualidad humana de Iván Arango

