



**Universidad del Sureste
Campus Comitán De Domínguez
Lic. Medicina Humana**



CUADRO COMPARATIVO

Nombre: Abril Amely Valdez Maas

Semestre: 3 Grupo: D

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Materia: Sexualidad Humana

Comitán de Domínguez, Chiapas.

Signos presuntivos , Probables y Positivos. Agregando las pruebas de deteccion y el momento de realizarlos.

Presuntivos	Probables	Positivos
<ul style="list-style-type: none"> •Ausencia de la menstruacion. •Amenorrea •Sensibilidad en las mamas •Sensacion de hormigueo y una especial sensibilidad en los pezones. •Nauseas y vomitos (Nauseas matutinas) •Miccion Frecuente •Sensacion de fatiga •Sueño 	<p>-Prueba inmunologica basada en la deteccion de hcG(Hormona gonodotropina corionica humana) En la orina de la mujer,Estas pruebas pueden producir un falso negativo si se hacen demaciado temprano. Las pruebas modernas de orina son 98%precisas 7 dias despues de la implantacion(Solo cuando falla una menstruacion)</p> <p>-Radio inmunoanalisis beta-hcG,Analiza la precencia de beta hcG en una muestra de sangre. Puede detectar niveles muy bajos de hcG de modo que puede detectar el embarazo 7 dias despues de la fertilizacion.</p> <p>-Pruebas caseras: Como</p> <ul style="list-style-type: none"> •first responce •fact plus •Answer •Clear Blue <p>TTodasestas son pruebas de orina diseñadas para medir la presencia de hcG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Latido del corazon fetal •Movimiento fetal activo •Deteccion del esqueleto fetal por medio de ultrasonido <p>Estos signos son indetectables hasta el 4to mes , A excepción de el ultrasonido que se puede utilizar en el 1er trimestre.</p>

Cambios Físicos por trimestre

Primer Trimestre

•Elevado Aumento de niveles de hormonas en especial estrógeno y progesterona .

•Las mamas se inflaman y hormiguean a causa del desarrollo de glándulas mamarias.

•Los pezones y el área que los rodea (areola) pueden oscurecerse y ampliarse.

•Necesidad de orina frecuentemente

•Náuseas matutinas, Sentimientos de náusea y repulsión hacia la comida o hacia su olor.

Aumento probable de los exudados vaginales.

•Sentimientos de fatiga y sueño.

Segundo Trimestre

•Durante el 4to la mujer se concientiza de los movimientos del feto (avivamiento)

Los problemas físicos de este periodo incluyen estreñimiento y sangrados nasales

•Desaparece la mayoría de los síntomas del 1er trimestre tales como las náuseas matutinas y las incomodidades se minimizan.

Es posible que el EDEMA sea un problema en cara, manos, muñeca, tobillos, pie, proviene de una mayor retención de líquido en todo el cuerpo..

Aproximadamente a la mitad del embarazo las mamas a causa de la estimulación hormonal, esencialmente han complementado su desarrollo en preparación del amamantamiento.

•Comenzando cerca de la decimonovena semana es posible que un delgado líquido amarillo o ámbar llamado calostro salga de los pezones, aunque todavía no hay leche.

La mujer se vuelve más consciente de su embarazo a causa de su vientre en rápida expansión

Tercer trimestre

•El útero es muy grande y duro

La mujer se percata de su tamaño y del tamaño del feto que se está volviendo más activo.

Algunas mujeres no pueden conciliar el sueño a causa de mareos y eructos.

El tamaño extremo del útero ejerce presión sobre otros órganos lo que ocasiona cierta incomodidad.

Durante esta etapa las mujeres sienten una disminución de energía

Hay presión sobre los pulmones lo que causa falta de respiración.

En el primer embarazo aproximadamente de 2 a 4 semanas antes del nacimiento el bebé rota y la cabeza desciende a la pelvis, se denomina descenso, aligeramiento o encajamiento.

El estómago se oprime y la ingestión se vuelve común.

El ombligo se ve empujado hacia afuera.

El equilibrio de la mujer se encuentra ligeramente trastornado debido a la gran cantidad de peso que se ha añadido a la parte frontal de su cuerpo. Lo cual puede adoptar el caminar de pato, que puede causar dolor de espalda.

El corazón se encuentra bajo tensión a causa del considerable aumento de volumen sanguíneo

El aumento de peso del segundo trimestre continúa

El útero se constriñe de manera dolorosa en las llamadas contracciones braxton-hicks.

Cambios psicologicos por trimestre

Primer Trimestre

•El estado emocional de una mujer durante el embarazo que con frecuencia se evaluar por medio de mediciones de depresion varia segun su multitud de factores.

primero su actitud hacia el embarazo hace una diferencia. Las mujeres que desean el embarazo se encuentran menos ansiosas que las mujeres que no lo desean.

un 2do factor es la calse social.Los bajos ingresos se asocian con depresion durante el embarazo.

3ra influencia:La disponibilidad de apoyo social.
Las mujeres que tienen una pareja que las apoya tienen menos probabilidades de estar deprimidas.

existen mayores probabilidades de que se presente depresion durante este trimestre en aquellas mujeres que estan experimentando eventos vitales estresanyes como : Mudarse de casa , cambio de empleo , cambio en sus relaciones o enfermedades.

Las mujeres que llevaban una vida activa antes de embarazarse pueden hallar que la fatiga y la falta de energia son inquietantes.

•Es frecuente que las ansiedades de las mujeres se centren alrededor de preocupaciones acerca de un aborto espontaneo

Segundo Trimestre

El segundo es un periodo de calma y bienestar relativo.

Disminuye el temor de aborto espontaneo o a medida que la mujer siente los movimientos del feto

Existen menos probabilidades de depresion, si la mujer tiene una pareja o esposo que cohabite con ella.

las mujeres que han tenido embarazos anteriores se encuentran mas angustiadas que las que no han tenido

las investigaciones tambien indican que las creencias de la mujer acerca del embarazo y acerca de como se deberia comportar durante el mismo estan bajo influencias culturales.

los sentimientos de cuidado o interes materno por el lactante aumentan progresivamente desde el periodo anterior del embarazo hasta el postparto.

Tercer trimestre

los patrones señalados con anterioridad continuan durante el 3er trimestre

El bienestar psicologico es mayor entre aquellas mujeres que cuentan con apoyo social.

Las mujeres que informaron un menor apoyo durante el embarazo se encontraron con mayores probabilidades de tener bebes con bajo peso al nacer.

Que tienen mayores ingresos , Pertenecen a la clase media y que experimentan menos sucesos vitales estresantes concurrentes.

Los esposos quienes informaron de mayores niveles de intercambio de afecto entre marido y mujer reportaron menores niveles de ansiedad e insomnio durante el 3er trimestre

Un comparativo de mujeres embarazadas por primera vez , con mujeres que habian experimentado embarazos previos , encontraron que las madres primerizas informaban de un aumento significativo en la inconformidad con sus maridos del 2do al 3er trimestre

Desarrollo fetal por trimestre

Primer Trimestre

Es el trimestre mas notable , Que en el 2do y 3ro. Esto se debe a que durante el 1er trimestre la pequeña masa de celulas implantadas en el utero se convierte en un feto con la mayoría de los importantes sistemas de organos presentes y con rasgos humanos reconocibles.

Para la 3ra sem de gestacion el embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2centimetros.

Durante la 3ra y 4ta sem , la cabeza se desarrolla de manera considerable. Se comienza a formar el sistema nervioso central y se pueden observar los inicios de los ojos y orejas.

Columna vertebral se construye para finales de la 4ta semana.

Al inicio del desarrollo embrionario se puede observar una cola pero esta ha desaparecido a la 8va semana.

Desde la 4ta y 8va sem,Se desarrollan las partes corporales externas: Ojos, Orejas , brazos,manos,dedos,piernas,pies,y dedos de los pies.

Al final de la decima semana, el embrión no solo tiene un conjunto completo de dedos si no que tambien tiene uñas.

para finales de la septima semana se han formado el higado ,pulmones,pancreas, riñones,el intestino y ya han empesado a funcionar de manera limitada

Tambien se han formado gonadas pero el genero del feto no se puede distinguir con claridad hasta la duodecima semana.

al final de la duodecima semana(Final del 1er trimestre)el feto es indudablemente humano y parece un pequeño lactante. Mide cerca de 10cm y pesa aprox 19gr. apartir de ese momento el desarrollo consiste principalmente de crecimiento y diferenciación de estructuras que ya se encuentran presentes.

Segundo Trimestre

Cerca del final de la decimacuarta sem , se pueden detectar los movimientos del feto(avivamiento)

Para la decimo octava semana la mujer ha podido sentir los movimientos durante 2 a 4 semanas y el medico puede detectar el latido cardiaco del feto

El feto abre sus ojos por primera vez alrededor de la vigesima semana

Aproximadamente para la vigesima cuarta semana es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in utero.En este momento los movimientos de brazos y piernas son vigorosas y el feto alterna entre vigilia y sueño

Tercer trimestre

Al final del 2do trimestre la piel del feto esta arrugada y cubierta de un vello sedoso.

Al principio del 3er trimestre se forman depositos de grasa por debajo de la piel, estos le daran al lactante la caracteristica apariencia regordeta de ños bebes .Se pierde el vello sedoso.

Durante el septimo mes el feto rota dentro del utero y asume una posicion de cabeza.

Al final del octavo mes pesa en promedio 2500gr

BIBLIOGRAFIA

Libro: Janet Shibley Hyde , John D
Delamater
Sexualidad Humana
novena edicion
Capitulo 7