






UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Campus Comitán de Domínguez
Medicina Humana Sexualidad
DRA. Mariana Catalina Saucedo Domínguez
Cuadro comparativo
Yereni Montserrat Pérez Nuricumbo
3er semestre grupo D





Trimestres



TRIMESTRES

Primer

Semanas

3ra semana

3 y 4 SDG

4

4ta y 8va semana

Finales de la S.7ma semana

:

Final de la S.10ma

Final 12 semana:

Que sucede (crecimiento)

Embrión mide 0.2 cm, parece 1 pedazo de carne.
Inicia a formar el SNC, inicios de los ojos y orejas.
Formacion Columna.

Desarrollo de las partes corporales externas
Formado (gonadas) hígado, pulmones y páncreas,
riñones e intestino y empezaron a funcionar
Final de la 10ma semana: Conjunto completo de dedos y uñas

feto completamente humano, mide 10 cm y pesa 19 gr
Aproximado.

Segundo

Final de la 14 SDG.

18 SDG-

20SDG:

24SDG.

(Avivamiento)

movimiento de 2 - 4 semanas y escuchamos el latido cardiaco.

Abre los ojos por primera vez.
(Sensible a luz y escucha los sonidos in útero, movimientos de brazos y piernas vigorosos)

Tercer

principio del 3er trimestre.

Al final del 7mo mes:

Últimos dos meses es rápido.



final de la 8vo mes:

Se forman depósitos de grasas x debajo de la piel, se ve regordeta del bebé y pierde el vello sedoso.

Feto rota dentro del útero (posición de cabeza).

Peso promedio de 2500 gr (bebé a término pesa 3300 gr y mide 50 cm)

Cambios físicos y psicosociales



TRIMESTRES

1er trimestre

Cambios físicos:

Aumento de estrógenos y progesterona * la placenta. mamas se inflaman y hormiguean a causa del desarrollo de las glándulas por las hormonas.
pezones y areola oscurecen y se amplía.
Micción frecuente por cambios en la hormona pituitaria y contracción del útero. Náuseas y vómito, cambio en el pH de la vagina, fatiga y sueño.

Cambios psicosociales:

Embarazada comenzar emocionadas, depresivas y luego caer llanto.
Factor: Clase social; P. bajo recursos suelen tener depresión. Disponibilidad del apoyo social,
Psicológicamente: embarazadas que tienen a su pareja no suelen estar deprimidas, (amortiguador. Pueden sufrir depresión por mudarse de casa o cambios en su empleo)

2do trimestre

estreñimiento y sangrados nasales, presencia de edema en cara, manos, muñecas, tobillos y pies.
mamas terminan su desarrollo para el amamantamiento. Líquido amarillo o ámbar "Calostro" sale de los pezones.

Período de calma y bienestar relativo. Disminuye temor a aborto espontáneo.
Psicológicamente: Disminuye la depresión, la embarazada tiene a su pareja, también existen creencias que implica la alimentación de **la embarazada**

3er trimestre

útero es grande y duro- Tiene eructos y no pueden dormir.
Útero ejerce presión sobre ciertos órganos, y provoca dificultad de respirar e indigestión, el ombligo se empuja hacia afuera, hay disminución de energía.

psicológicamente: El bienestar se da en aquellas que tienen el apoyo social de su pareja, buenos ingresos, y que experimentan menos sucesos estresantes

Signos

Signos presuntivos

Urinario: Poliaquirría;

Mamas: Tensión, sensibilidad, calostro, corpúsculos de Montgomery (glándulas periareolares), pigmentación pezón y areola, red venosa aumentada, estrías.

Digestivo: Nauseas, vómitos, sialorrea, estitíquez.

Nervioso: Somnolencia, irritabilidad, labilidad emocional, insomnio, fatigabilidad, apetito caprichoso, aversión a ciertos olores.

Abdomen: Aumento de volumen, línea parda, aumento de vello

Extremidades Inferiores: Dilatación venosa, várices

Probables

Atraso menstrual Chadwick: coloración violácea de paredes vaginales.

Útero: cervix blando, útero aumentado de volumen, cambio en la forma uterina, cambio de consistencia uterina.

Piscosek. Asimetría en los cuernos Noble & Budín: disminución de la profundidad del fondo: de saco lateral Oscander: pulso palpable en fondos de saco laterales McDonald:

Fácil flexión del cuerpo uterino sobre el cervix (7 a 8 semanas) Hegar I:

Reblandecimiento istmico que permite alcanzar paredes anterior y posterior del útero Hegar II:

reblandecimiento del cuerpo permite alcanzar el fondo de saco anterior y maniobra abdominal (6 a 8 sem)

Goodel: reblandecimiento y cianosis del cuello uterino

Pruebas de detección

Prueba inmunológica: Detección de la presencia de Gonadotropinas coriónica humana, secretada por la placenta. (Mezclar una gota de orina sobre un porta objetos)



Prueba radioinmunoanálisis beta hCG: Analiza la presencia de beta hCG en una muestra de sangre.

Pruebas caseras: First Response, Fact plus, Answer y Clear blue.

Positivos

- frecuencia cardíaca fetal
- percepción de los movimientos fetales.
- percepción por palpación de las partes fetales.

Signos



PRUEBAS PARA REALIZAR

CUANDO SE REALIZA

Signos presuntivos

Examen físico
Ultrasonido

Sensibilidad de las mamas
Nauseas
Fatiga
Apetito caprichoso
Amenorrea
Vómitos

Signos probables

First Response
Fact plus
Answer y clear blue

Agrandamiento del vientre
Cambios de tamaño, consistencia y forma de genitales
Aumento de tamaño del pecho y sensibilidad
Desequilibrio emocional

Signos positivos

Prueba de detección de hCG
Pruebas de orina
Frecuencia cardiaca del feto.
Radioinmunoanálisis beta-hCG

Se acompañada de amenorrea

Bibliografía

Hyde, J. S., DeLamater, J. D., & Margarita, O. B. S. (2007). Sexualidad Humana (9a. Edición.). McGraw-Hill Interamericana.