



Universidad Del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana



Fisiopatología 3


Mapas mentales

Gabriela Montserrath Pulido Padilla

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

4º semestre "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de noviembre de 2023.



**ALTERACION DE LA
FUNCION
GLOMERULAR**

Síndrome nefrítico agudo

- ✚ Es la correlacion clínica de la inflamación glomerular
- ✚ En su forma mas grave se caracteriza por hematuria, grados variables de proteinuria, TFG disminuida, oliguria

Glomerulonefritis de progresión rápida

- ✚ Síndrome que se caracteriza por signos y síntomas de lesión glomerular grave sin una causa especifica
- ✚ Síndrome de goodpasture

Síndrome nefrítico

- ✚ Se caracteriza por proteinuria masiva y lipiduria junto con hipoalbuminemia relacionada, edema generalizado e hiperlipidemia

Síndrome de alport


- ✚ Es una anomalía hereditaria de la MBG que genera hematuria y puede progresar a insuficiencia renal crónica

Hematuria

- ✚ Nefropatía por inmunoglobulina A
- ✚ Nefritis a la purpura de Henoch-Schonlein

Glomerulonefritis crónica

- ✚ Es la fase crónica de varios tipos especificos de glumerolunefritis



ENFERMEDAD RENAL CRONICA

Manifestaciones clínicas

- Acumulación de desechos nitrogenados
- Alteraciones hidroelectrolíticas
- Anomalías minerales y esqueléticas
- Anemia y alteraciones de la coagulación
- Hipertensión

Daño renal o una TFG menor de 60ml/min. 1.73m durante tres meses o mas

La albumina sirve como parámetro clave para medir la lesión y reparación de las nefronas

- Debilidad extrema
- Vomitos frecuentes
- Letargia y confisiones

Grave

Causas

- Alteraciones oseas
- Hipertensión
- Anemia
- Cuagulopatias

Tratamiento

Inmunosupresores de sostén casi siempre consiste en prednisona azatioprina y ciclosporina

Inicio

- Debilidad
- Fatiga
- Nauseas
- Apatía

Incontinencia funcional

- ✚ Causa problemas a una persona que intenta utilizar el baño cuando siente necesidad de orinar

Incontinencia de esfuerzo

- ✚ Es la perdida involuntaria de orina por tos, risa, estornudo o cuando se levantan objetos pesados que aumentan la presión intrabdominal

Incontinencia de urgencia

- ✚ Perdida involuntaria de orina relacionada con un fuerte deseo de orinar

INCONTINENCIA URINARIA

Diagnostico

- ✚ Análisis de orina
- ✚ Ecografía
- ✚ Diario del funcionamiento de vejiga
- ✚ Medición del residuo posmiccional

Tratamiento

- ✚ Ejercicios pélvicos
- ✚ Tratamiento farmacológico → aumente el tono del esfínter

Incontinencia por rebosamiento

- ✚ Perdida involuntaria de orina que ocurre cuando la presión intravesical supera la presión uretral máxima debido a la distensión vesical en ausencia de actividad del detrusor