



## Cuadro descriptivo

*Nombre del Alumno Zahobi Bailon Peralta*

*Nombre del tema- DIABETES MELLITUS II*

*Tercer parcial*

*Nombre de la materia- Medicina interna*

*Nombre del profesor- Gerardo Gordillo Cancino*

*Nombre de la Licenciatura- Medicina humana*

*Cuatrimestre- 5to semestre*

| Definicion   | Manifestaciones clinca  | Criterios diagnosticos   | Principales complicaciones   | Tratamiento   |
|--|---|--|--|---|
| <p><b>Se describe como un desorden metabolico de multiples etiologia, caracterizado por hipoglusemia cronica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteinas</b></p> | <p>Poliuria<br/>Polidipsia<br/>Perdida inexplicable de peso<br/>Polifagia</p> | <p>Pruebas de tolerancia oral a la glucosa<br/>PTOG<br/>Medicon de la glusemia 2 hrs despues despues de dar carga oral de 75 grms de glucosa</p> <p>Glusemia medida en plasma venoso que sea o igual mayor a 200 mgxdl</p> | <p>Neuropatia periferica- ocurre cuando los nervios fuera del cerebro y la médula espinal (nervios periféricos) se dañan.<br/>Nefropatia-Es un trastorno renal en el cual anticuerpos (llamados IgA) se acumulan en el tejido del riñón.<br/>Disfunción gastrointestinal-<br/>Disminución de la acomodación del estómago causada por la pérdida de neuronas inhibitorias gástricas o daño del nervio vago.<br/>Y geniturinarias-Las personas con diabetes son más propensas a desarrollar infecciones de las vías urinarias, conocidas también como infecciones de la vejiga o cistitis.</p> | <p>Orlistat y liraglutido- Para manejo cronico de peso<br/>Fentermina<br/>Metformina y cambios en el estilo de vida 425 mg diarios e incrementando de manera gradual<br/>Combinacion temprana de diversos antidiabeticos orales como la tiazolidinedionas , secratagos de insulina , inhibidores DPP4 Y TERAPIA</p> |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | La retinopatía- diabética es una afección del ojo que puede causar pérdida de visión y ceguera en personas con diabetes |  |
|--|--|--|---|--|