



Mi Universidad

Cuadro

Nombre del Alumno: Yari Karina Hernández Chacha

Nombre del tema: Diabetes tipo 11

Parcial :3ro

Nombre de la Materia: Medicina Interna

Nombre del profesor: Cancino Gordillo Gerardo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

5to Semestre Grupo C

Comitan De Domínguez 16 De Noviembre 2023

Diabete tipo II

9 Nov 23

Manifestaciones clinicas

- Orinar con frecuencia
- Sentir mucha sed
- Fatiga extrema
- Cortes o moretones que tardan en sanar
- Perdida de peso
- Hombreo, dolor o entumecimiento en las manos o pies.

Criterios de diagnostico.

La prueba A1C mide tu nivel de glucosa en sangre promedio durante los ultimos dos o tres meses.

- La diabetes se diagnostica con una A1C mayor o igual a 6.5%.

Resultado	A1C	Diabetes ≥ 126 mg/dl
Normal	menos de 5.7%	Prediabetes < 126 mg/dl
Prediabetes	5.7% a 6.4%	Normal < 100 mg/dl.
Diabetes	6.5 o más	

La diabetes se diagnostica cuando el nivel de glucosa en sangre en ayunas es superior o igual a 126 mg/dl.

Resultado Glucosa plasmatica en ayunas

Normal	menor que 100 mg/dl
prediabetes	100 mg/dl a 125 mg/dl
Diabete	126 mg/dl o mas

Complicaciones

Neuropatía Diabética > ocurre en cerca de la mitad de los individuos con DM tipo 1 o 2 de larga evolución. En ocasiones se manifiesta como neuropatía difusa o polineuropatía distal simétrica, neuropatía se correlaciona con la duración de la diabetes y el control de la glucemia.

Retinopatía > Es la principal causa de retinopatía crónica la neuropatía diabética y ESRD que requiere de trasplante renal. La CDC en individuos con DM está vinculada con un riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares y el pronóstico para sujetos con diabetes sometidos a la diálisis es desfavorable.

Disección gastrointestinal / Genitourinaria > La DM tipo 1 y 2 de larga evolución puede afectar la motilidad y el funcionamiento de los aparatos gastrointestinal y genitourinario. Los síntomas más prominentes son vaciado gástrico lento (gastroparésis) y alteraciones de la motilidad del colon e intestino delgado (constipación o diarrea). La gastroparésis se presenta en ocasiones con síntomas de anorexia, náusea, vómito, saciedad temprana y distensión abdominal.

Infecciones

- Celulitis
- Pie diabético
- Neumonia adquirida en la comunidad