



**Mi Universidad**

## **Cuadro comparativo**

*Bryan Reyes González*

*Cuadro comparativo de DM2*

*Parcial: 3°*

*Medicina Interna*

*Dr. Gerardo Cancino Gordillo*

*Licenciatura de Medicina Humana*

*Semestre: 5to., Grupo: C*

*Comitán de Domínguez, Chiapas. A 24 de noviembre del 2023.*

## Diabetes tipo 2

### Definición

La diabetes de tipo 2 afecta a la forma en que el cuerpo usa el azúcar (glucosa) para obtener energía, impidiendo que use la insulina adecuadamente, lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre si no se trata.

### Criterios diagnósticos

Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dL (11.1 mmol/l).

Prueba diagnóstica	Características	Criterios diagnóstico ADA
Glucemia plasmática en ayunas	Análisis de sangre en ayunas	>126 mg/dl
HbA1C	Prueba indicada para el control de la diabetes	>6,5%
Glucemia plasmática a las 2 horas de sobrecarga oral a la glucosa	Determinación de la glucemia en plasma venoso a las 2 horas de tomar una bebida con 75 g de glucosa	>200 mg/dl
Glucemia plasmática	Análisis de sangre	>200 mg/dl

### Manifestaciones clínicas

Oriarar con mucha frecuencia, sentir mucha sed tener mucha hambre aún que se este comiendo, fatiga extremo, vista borrosa, cortes o moretones que tardan en sanar , hormigueo, dolor o entumecimiento en las manos o pies.

### Tratamientos

- Control en la dieta.
- Ejercicio.
- MEDICAMENTO: Sulfonilureas, Metformina, Acarbosa, Tratamiento oral combinado, resiglitazona

## Complicaciones

- **Complicaciones renales de la diabetes mellitus:** La nefropatía diabética es la principal causa de nefropatía crónica que requiere trasplante renal. La CDK en individuos con DM está vinculada con un riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares y el pronóstico para sujetos con diabetes es desfavorable.
- **Nefropatía Diabética:** Principal causa de nefropatía crónica. La CDK de individuos. Es la complicación tardía de diabetes. Se refiere el daño predominante de tipo glomerular. Frecuentemente se añade daño por hipertensión arterial.
- **Disfunción gastrointestinales:** La DM, tipos 1 y 2 de larga evolución puede afectar la motilidad y el funcionamiento de los aparatos gastrointestinal. Los síntomas más prominentes son vaciogastrico y alteraciones de la motilidad del colon o el intestino delgado