



Cuadro

Joseph Eduardo Córdova Ramirez

Cuadro sobre Diabetes tipo II

Medicina interna

3er parcial

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Medicina Humana

Comitan de Domínguez 24 de noviembre de 2023

DIABETES TIPO II

MANIFESTACIONES CLINICAS

1. Poliuria
2. Polidipsia
3. Polifagia
4. Perdida de peso subita
5. Cetoacidosis (nauseas, vomitos, dificultad para respirar, aliento olor dulce, boca muy seca)
6. Acantosis nigricans
7. Xantomatosis eruptiva

CRITERIOS DIAGNOSTICOS

1. Glucemia de ayuno >120 mg DL
2. Glucemia 2 horas poscarga 140-199 mg/dl
3. Hemoglobina glucosilada >6.5 %

DIABETES TIPO II

TRATAMIENTO

1. Alimentación saludable
2. Ejercicio de forma regular
3. Buen control de peso
4. Control de glucosa sanguínea
5. Eliminar consumo de tabaco

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

1. Metformina
2. Sulfonilureas
3. Inhibidores del cotransportador de sodio glucosa
4. Tratamiento con insulina

DIABETES TIPO II

FACTORES DE RIESGO

1. Dislipidemia
2. Historia familiar
3. Sedentarismo
4. Sop
5. Obesidad

CRITERIOS DIAGNOSTICOS

-Agudas-

1. Hipoglucemia
2. Cetoacidosis
3. Coma Diabético

-Crónicas-

1. Neuropatia
2. Pie diabético
3. Retinopatía
4. Enfermedad Vascular
5. Nefropatía
6. Hipertensiom
7. Hiperfolesterolemia

DIABETES TIPO II

DEFINICIONES

1. **Neuropatía diabética:** A la Neuropatía diabética somática que afecta los nervios sensitivos y motores voluntarios y puede corresponder a un daño difuso (polineuropatía) o localizado en un nervio (mononeuropatía).
2. **Nefropatía diabética:** A la complicación renal tardía de la diabetes. Se refiere al daño predominante de tipo glomerular, con compromiso intersticial.
3. **Retinopatía diabética:** Al compromiso de los vasos pequeños, concluyendo los capilares, con aumento de la permeabilidad, que permite la salida de líquidos formando exudados duros, obstrucción de vasos con infartos, produciéndose exudados blandos.
4. **Infecciones:** Infecciones urinarias, respiratorias bajas e infecciones mucocutáneas bacterianas y fungicas.