



Mi Universidad

Cuadro

Galia Madeline Morales Irecta

Cuadro de Diabetes Mellitus T2

Parcial 3

Medicina Interna

Gerardo Cancino Gordillo

Licenciatura en medicina humana

5°C

Comitán de Domínguez, Chiapas, 24 de noviembre del 2023

Manifestaciones Clínicas

Poliuria, polidipsia, Polifagia, Pérdida de peso, cetoacidosis, náuseas, cefaleas, Parestesias, Visión borrosa, Prurito no explicado, Infecciones de repetición.

Criterios Diagnósticos

Criterios	Pre - diabetes	Diabetes
ACI	5.4 – 6.4% (39- 47mmol/mol)	>6.5% (48 mmol/mol)
FPG	100-125 mg/dL	>126 mg/dL
Glucemia 2 hrs despues de comer	140-199 mg/dL	>200 mg/dL
Glucemia al azar	-----	>200 mg/dL

Tratamientos

Manejo multifactorial, control de factores de riesgo incluyendo hiperglucemia, dislipidemias, hipertensión arterial y tabaquismo:

- Sulfonilureas, Miglitinidas, Análogos de GLP1, Inhibidores DPP-4, Glitazanos, Inhibidores alfa-glucosidasa, Inhibidores SGLT-2, Biguanidas

Complicaciones

Nefropatía diabética

Es la complicación renal tardía de la diabetes se refiere al daño predominante de tipo glomerular con compromiso intestinal, se añade daño por hipertensión arterial y debe de valorarse a los 5 años del diagnóstico en diabetes tipo 2.

Neuropatía diabética

Esta se encarga de afectar los nervios sensitivos y motores voluntarios y puede corresponder a un daño difuso o localizado en un nervio la neuropatía autonómica se manifiesta por gastroparesia, vejiga neurogénica, disfunción eréctil e hipotensión ortostática.

Retinopatía diabética:

Al compromiso de vasos pequeños incluyendo capilares con aumento de permeabilidad, que permite salida de lípidos formando exudados duros, obstrucción de vasos con infarto, ruptura de vasos, causa microhemorragias, debe valorarse al momento de dx de DM2.

Microalbuminuria

Es la excreción urinaria de 30 y 300 mg de albúmina/gramo creatinina. Una de las complicaciones de diabetes y consiste en la excreción de albúmina por la orina.

Macroalbuminuria:

Es la excreción urinaria mayor a 300 g de albúmina por día o más de 200 mg/min

Infecciones:

Personas con DM2 tienen mayor riesgo de infecciones por hongos en forma de levadura, infecciones serias del oído externo con la bacteria pseudomona aeruginosa