



Nombre del Alumno: Andrea Citlali Maza López

Nombre del tema: Flashcards de otorrinolaringología.

Parcial: cuarto

Nombre de la Materia: Clínicas quirúrgicas complementarias.

Nombre del profesor: Adriana Bermúdez Avendaño


Nombre de la Licenciatura: medicina humana

Séptimo semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas, 13 de diciembre del 2023

OTITIS MEDIA AGUDA

Es una infección aguda bacteriana (retención de pus en la caja timpánica) de la mucosa que tapiza las cavidades del oído medio y que, en condiciones normales, es estér




Tratamiento

En amoxicilina a dosis de 80 a 90 mg/Kg de peso por día durante 5 a 10 días de acuerdo a la edad del paciente.
amoxicilina/acido clavulánico durante 5 a 10 días

- Para el diagnóstico de la otitis media aguda se deben considerar los signos y síntomas específicos, como son la otalgia, la otorrea aguda o la otoscopia con datos inequívocos de inflamación. Se puede observar el tímpano hiperémico, opaco y abombado con mala motilidad.

FARINGOAMIGDALITIS

infección de la faringe y de las amígdalas que se caracteriza por garganta roja de más de cinco días de duración.



Tratamiento

Faringoamigdalitis bacteriana.

- Amoxicilina ácido clavulánico 500 mg c/8 hrs. 10 días
- Cefalosporina de primera generación 10 días
- Penicilina compuesta de 1,200,000 UI una aplicación cada 12 horas por dos dosis, seguidas de 3 dosis de penicilina procainica de 800,000 UI cada 12 horas intramuscular.

En casos de alergia a la penicilina:

- Eritromicina 500 mg vía oral cada 6 horas por 10 días
- Trimetroprima sulfametoxazol tabletas de 80/400 mg, 2 tabletas vía oral cada 12 hrs. por 10 días

Tratamiento

Faringoamigdalitis viral. El tratamiento es inicialmente sintomático durante los primeros tres días

- Paracetamol 500mg VO cada 8hs de 3 a 5 días
- Naproxeno 250 mg vía oral cada 12 horas de 3 a 5 días

El diagnóstico de faringoamigdalitis aguda es clínico.

Los síntomas que se deben investigar son:

- Fiebre
- Cefalea
- Anorexia
- Rinorrea y cambios en las características de la secreción nasal
- Tos
- Disfonia
- Vómito
- Dolor abdominal