



Johana Nazareth Vázquez Flores

Dra. Adriana Bermudez Avendaño

Clínicas quirúrgicas

7mo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de Diciembre del 2023

Oído externo

Factores de riesgo generales

- Piscina
- UO de bartoncello
- Curo extraño
- Diabetes Mellitus

Furunculosis del oído

Infección de la glándula pilosebacea

Cuadro clínico

- Otorrhea
- It de trazo purulento

Tratamiento

- Cloxacilina
- Amoxicilina - ácido clavulánico
- Mupirocina tópica

Taponamiento de cerumen

Quando se presenta obstrucción por completo

Cuadro clínico

- Hipoacusia
- Aurofonia

Tratamiento

- Extracción
- Aspiración mediante aspirador

Pericondritis del pabellón

Cuadro clínico

- Pabellón erigido
- Pabellón edematoso
- Abceso subpericard

Tratamiento

- Antibiótico
 - Ciprofloxacino
 - Aminoglicósidos
- Drenaje de abceso con vendaje

Otitis externa difusa

Etiología

- Pseudomonas
- Aureofungus
- Staphylococci

Otitis del nadador

Emripelas

Demipodermatitis del pabellón e de la región preauricular

Cuadro clínico

- Caliente
- Riza
- Escalas elevadas
- Adenopatías
- Fiebre
- Material general

Provocado por

- Streptococo del grupo A
- Staphylococci Acan

Tratamiento

- Cloxacilina
- Amoxicilina - ácido clavulánico
- Clindamicina

Otomiconia

Infección por hongos

Etiología

- Aspergillus
- Candida

Favorecido por empleo prolongado de antibi. manipulación

Tratamiento

- Antifúngicos tópicos

Oído Medio

Factores de riesgo general

- Piscina
- UO de bartoncello
- Curo extraño
- Diabetes Mellitus

Complicaciones

Intuitemporales

- Alargamiento de pabellón
- Lini oído
- Drenaje tímpano-mastoides
- Abceso de Bezold

Pertinencia

- Mastoiditis + pusei cronodeti

Intraurales

- Abceso subdura / extracural
- Tromboflebitis

Otitis media otomococica

Inflamación del oído medio en la que existe una colección de líquido

Incidencia

2-6 años

Manifestaciones clínicas

- Taponamiento oído
- Chirrido
- Hipoacusia

Otitis media crónica

Inflamación crónica generada por la presencia de un epitelio

Tratamiento

- Quirúrgico

Otitis media aguda

Infección aguda bacteriana

Se distinguen 2 fases

- 1 Fase de colección: Anulo de mat. purulento
- 2 Fase de otorrea: Salida de material purulento

Clínica

Otorrea fetida / purulenta
Hipoacusia grave

Intolerancia

6 meses a 3 años