

## INSUFICIENCIA HEPATICA CRONICA

ES UNA ENFERMEDAD ASOCIADA A FALLA HEPATICA, SE CARACTERIZA POR UN PROCESO DIFUSO DE FIBROSIS Y LA CONVERSION DE LA ARQUITECTURA NORMAL EN UNA ESTRUCTURA MODULAR ANORMAL QUE PUEDE PRESENTARSE COMO LA ETAPA FINAL DE DIVERSAS ENFERMEADES HEPATICAS DE DIFERENTES CAUSAS.

### ETIOLOGIA

LAS CAUSAS MAS FRECUENTES SON LA ENFERMEDAD HEPATICA POR ALCOHOL SEGUIDA DE LA OCASIONADA POR AGENTES INFECCIOSOS.

### SINTOMAS

FATIGA.  
DEBILIDAD.  
NAUSEAS.  
HIPOREXIA.  
OSTEOPOROSIS.

### DIAGNOSTICO

LOS HALLAZGOS DE LABORATORIO SUGESTIVOS DEPENDERAN DEL DAÑO Y ESTOS DEBEN REFLEJARSE Y MODIFICARSE EN LAS SIGUIENTE:

TROMBOCITOPENIA.  
ANEMIA.  
LEUCOPENIA.  
PROLONGACION DEL TIEMPO DE PROTOMBINA.  
HIPERBILIRRUBINEMIA.  
INCREMENTO DE LA FOSFATASA ALCALINA.  
AMINOTRANSFERASAS INCREMENTADAS.  
HIPOALBUMINEMIA.  
HIPERGLOBULINEMIA.

SE RECONOCE QUE NO EXISTE NINGUNA PRUEBA DE LABORATORIO QUE VPA POR SI MISMA SEA SENSIBLE Y ESPECIFICA PARA EL DIAGNOSTICO.

### TRATAMIENTO

USO DE DIURETICOS; ESPIRONOLACTONA, FUROSEMIDA Y AMILORIDA.  
CONTROLAR EL CONSUMO DE PROTEINAS.  
RESTRINGIR EL SODIO EN LA DIETA.  
EVITAR EL ALCOHOL.  
TRASPLANTE HEPATICO.

## VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

PROY. AIO 101101V

LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO HA DEMOSTRADO QUE LA DETECCIÓN Y MANEJO OPORTUNO DE LAS COMPLICACIONES REPERCUTE DE MANERA FAVORABLE EN LA SOBREVIVENCIA Y LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE.

SE RECOMIENDA:

EVALUAR CLINICAMENTE CADA 2 MESES.

CADA 6 MESES CON EXAMENES DE LABORATORIO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION MEDICA.

REALIZAR ENDOSCOPIA CADA DOS AÑOS EN PACIENTES CON CIRROSIS?

## PREVENCION

CORRECTA HIGIENE DE MANOS.

VACINACION CONTRA HEPATITIS A Y B.

NO INGERIR CANTIDADES GRANDES DE ALCOHOL.

USAR MEDICAMENTOS CON PRUDENCIA.

PROTEGER LA PIEL.