



Arguello Tovar Avilene Del Rocío

Dr. Cruz Domínguez Jesús Eduardo

Clínicas Médicas Complementarias

Insuficiencia Hepática Crónica

Grado: 7 B

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de noviembre del 2023

INSUFICIENCIA HEPATICA CRONICA O CIRROSIS
- ASCITIS-

Es una enfermedad asociada a falla hepática, se caracteriza por un proceso difuso de fibrosis y la conversión de la arquitectura normal en una estructura nodular anormal, que puede presentarse como la etapa final de diversas enfermedades hepáticas de diferentes causas.

Factores de riesgo

- Antecedente de hemotransfusión (es) previo a 1992
- Uso de drogas intravenosas
- Promiscuidad sexual (hepatitis B y C)

Considerar que los pacientes que desarrollan insuficiencia hepática crónica pueden cursar con algunas condiciones como

1. Enfermedades autoinmunes
2. Enfermedades metabólicas genéticas
3. Obstrucción biliar
4. Alteraciones vasculares
5. Uso crónico de medicamentos hepatotóxicos por lo que se recomienda vigilancia

Diagnóstico etapa temprana

Es inespecífica

- Anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga y osteoporosis.

Descompensada

- Ictericia, Ascitis, asterixis, ginecomastia, hepatomegalia, eritema palmar, telangiectasias, esplenomegalia y atrofia muscular.

Criterios de CHILD=PUGH	Child A: 5 a 6 puntos
Bilirrubina(mg.dL)	Child B: 7 a 9 puntos
	Child C: 10 a 15 puntos
Ascitis	
Tiempo de protombina	
Encefalopatía Hepática	
Albumina (g.dL)	

Apoyo diagnóstico

- Bh, PFH, Tiempo de protombina, realizar endoscopia cada 2 años
- USG abdominal.

Tratamiento

- Tratar complicaciones, encefalopatía hepática, ascitis, varices gastroesofágicas