

## **Universidad del Sureste.**

Campus Comitán de Domínguez, Chiapas.

Licenciatura en Medicina Humana.

**Actividad:** Flashcards de oftalmología.

**Integrantes del equipo:** Iris Rubí Vázquez Ramirez,

**Materia:** clínicas quirúrgicas complementarias.

**Grado:** séptimo semestre **grupo:** "B"

**Nombre del docente:** Dra. Adriana Bermúdez Avendaño.

## HIPERMETROPIA

Los rayos se enfocan detras de la retina, bien porque el eje del globo es demasiado corto o porque el poder de refracción del segmento anterior es menor de lo normal, lo que hace que los objetos cercanos se vean borrosos.

**CLÍNICA:** ASTENOPIA, DOLOR OCULAR, VISION BORROSA, CONGESTION OCULAR CON CONJUTIVITIS Y BLEFARITIS, ESTADO NAUSEOSO, PUEDE APARECER ESTRABISMO CONVERGENTE.

**TRATAMIENTO:** LENTES CONVERGENTES.

## MIOPÍA

Los rayos se focalizan delante de la retina, bien porque el poder refractivo del segmento anterior sea excesivo o porque el eje anteroposterior del ojo sea demasiado grande, haciendo que haya mala vision de lejos.

**DIAGNOSTICO:** EXAMEN VISUAL Y TEST DE REFRACCIÓN

**TRATAMIENTO:** LENTES DIVERGENTES, QUE RETRASAN EL LUGAR EN EL CUAL CONFLUYEN LOS RAYOS DE LUZ.

## ASTIGMATISMO

Las imagenes no se focaliza en el mismo plano, sino entre las denominadas focales anterior y posterior, en el llamado conoide de Sturm.

**CLINICA:** VARIA SEGUN EL GRADO. EN EL ASTIGMATISMO MAYOR HAY MALA AGUDEZA VISUAL A CUALQUIER DISTANCIA.

**TRATAMIENTO:** LENTES CILINDRICOS O CON LENTES DE CONTACTO

## ORZUELO

Infección estafilococica aguda de la glandula de Zeiss o de Moll o Meibomio.

**CLÍNICA:** INFLAMACIÓN LOCAL QUE EVOLUCIONA A LA FORMACIÓN DE UN ABSCESO, DRENANDO A LA PIEL A LA CONJUNTIVA TARSAL ESPONTANEAMENTE.

**TRATAMIENTO:** COMPRESAS CALIENTES, ANTIBIOTICOS, AINES LOCALES Y DRENAJE QUIRURGICO.