



**Arguello Tovar Avilene Del Rocío**

**Dra. Bermudez Avendaño Adriana**

**Clínicas Quirúrgicas**

**Mapa**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado: 7 B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de noviembre del 2023

## Estado de la piel

Fracturas cerradas: cuando la piel no ha sufrido daño.

Abiertas: Cuando la piel a sufrido daño

Trazo de la fractura

- Transversales / Longitudinales
- Oblicua / ala de mariposa
- Multifragmentada / Conminutas



## Es

Una fractura se define como la interrupción de la continuidad, de una placa fisiaria, ósea y/o cartilaginosa.

A consecuencia de un traumatismo directo o indirecto.

## Paciente pediátrico

Fractura en tallo verde (incompleta)  
Fractura de torus o en rodete.

LOCALIZACIÓN

- Epifisis o zona articular
- Metafisis
- Diafisis



## TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA



## Tratamiento

Método RICE

- R: reposo
- I: Hielo
- C: Compresión
- E: Elevación

Conseguir recuperación funcional del segmento involucrado



## Gustilo y Anderson

Tipo I: baja energía <10mm

Tipo II: Mayor energía >10mm

Tipo III:

- IIIA: Alta energía y Contaminada
- IIIB: Alta energía y hueso descubierto
- IIIC: Alta energía y lesión vascular

## Fractura de miembro superior

Clavícula, escapula, extremidad proximal del húmero, Diafisis del húmero, cabeza del radio, olecranon, Diafisis del antebrazo, radio distal, escafoides, metacarpianos y falanges.

## Fractura de miembro inferior y de pelvis

Pelvis, acetabulo, extremidad proximal del femur, Diafisis femoral, fémur distal y meseta tibial, tobillo calcaneo, astragalo, extremo proximal del quinto metatarsiano

