



Altuzar Gordillo Erika Patricia.

Aguilar Ocampo Cristian Jonathan.

Infografía.

Análisis de la decisión en la clínica.

8° semestre

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de octubre del 2023

SEPSIS NEONATAL.

DEFINICIÓN.

Afección de pequeños bronquios con aumento de producción de moco y broncoespasmo que genera obstrucción de la vía aérea.



ETIOLOGIA.

Virus sincitial respiratorio responsable de hasta el 80% con un periodo de incubación de 4-5 días. .



EPIDEMIOLOGIA.

- Afecta a <2 años con predominio entre 3-6 meses de edad.
- Se presenta esporádicamente o epidemiológicamente en los meses de noviembre a marzo.
- 90% de los casos requieren hospitalización son < de 12 meses de edad.



FACTORES DE RIESGO.

- Prematurez.
- bajo peso al nacer.
- cardiopatía.
- enfermedad pulmonar crónica.
- Hipertensión pulmonar.
- Familia de bajos recursos.



DIAGNOSTICO.

- Clínico.
- Inicia con cuadro similar a resfriado común que al 2º O 3º día progresa a
- dificultad respiratoria y taquipnea.
- sibilancias espiratorias mas común.
- Estertores crepitantes finos.



TRATAMIENTO.

- Nebulización de solución salina hipertónica al 3%.
- dosis única de salbutamol en aerosol
- Palivizumab.



Libros

Referencias:

Social, I. M. (2016). Sepsis neonatal. *Guia de pràctica clínica*, 73.