



Nombre del alumno: Jacqueline Domínguez Arellano

Nombre del profesor: dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Nombre del trabajo: Unidad II Etapas en el análisis de decisiones

Materia: Análisis de decisión en la clínica

Grado: 8°

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS INFECCIOSA EN MUJERES DE EDAD REPRODUCTIVA

INFECCIÓN DE LA MUCOSA VAGINAL QUE SE DEBE A LA MODIFICACIÓN DE LA FLORA BACTERIANA NORMAL DE LA VAGINA

EPIDEMIOLOGÍA

Más común en mujeres sexualmente activas entre 15-49 años.
Entre 15-16% en mujeres embarazadas



FISIOPATOLOGÍA



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

- Flujo anormal poco espeso blanco o grisáceo
- Escosor vaginal
- Mal olor (pescado)
- Intensificación del olor despues de las relaciones sexuales
- Asintomaticas



DIAGNOSTICO

Están presentes al menos 3 de las siguientes características:

- Secreción blanca delgada homogénea.
- Producción de un olor a pescado
- pH vaginal mayor de 4,5
- «Células clave» en el examen microscópico

TRATAMIENTO

Oral

- Metronidazol → el más usado.
- Clindamicina
- Tinidazol

Intravaginal

- Metronidazol en gel
- Clindamicina en crema
- Óvulos 100 mg

Bibliografía

Social, I. M. (s.f.). Diagnostico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres de edad reproductiva. *Instituto Mexicano del Seguro Social* , págs. 1-13 .