



**Nombre de alumno: Isabela Guillen
Borbolla**

**Nombre del profesor: María José
Hernandez Mendez**

**Nombre del trabajo: Reflejos arcaicos del
recién nacido**

Materia: Submodulo II

Grado: 5to semestre

Grupo: Enfermeria

REFLEJOS ARCAICOS DEL REECIEN NADCIDO

Galant

Incurvación del tronco o reflejo de Galant: este reflejo se presenta cuando se acaricia o da golpecitos a lo largo del lado de la columna mientras el bebé permanece boca abajo. El bebé arquea ligeramente el cuerpo hacia ese lado. Este reflejo suele desaparecer en torno a los 4 meses.



Moro

En respuesta al sonido, el bebé echa la cabeza hacia atrás, abre los brazos y las piernas, llora, y después vuelve a colocar los brazos y las piernas en la posición original. El bebé puede sobresaltarse con su propio llanto y así generar este reflejo. Este reflejo dura unos dos meses.



Busqueda

Este reflejo se produce cuando se toca o acaricia la comisura de los labios del bebé. El bebé gira la cabeza y abre la boca para seguir y "buscar" en la dirección de la caricia. Esto ayuda al bebé a encontrar el pecho o el biberón para alimentarse. Este reflejo dura alrededor de cuatro meses.



Marcha Automatica

Reflejo de marcha automática: si al sostenerlo por debajo de axilas inclinamos su cuerpo ligeramente hacia delante y dejamos que el dorso del pie tome contacto con una superficie plana, evitando que las piernas soporten su peso, comenzará a flexionarlo y estirarlo una tras otra, avanzando con los pies como si fuera a caminar.



Tónico del cuello

La posición tónica del cuello a menudo se describe como posición de esgrima, debido a que se asemejan a la pose de un esgrimista. Este reflejo se presenta cuando se acaricia o da golpecitos a lo largo del lado de la columna mientras el bebé permanece boca abajo.



Presión palmo-plantar

Reflejo de presión palmo-plantar: si presionamos la palma de su mano la cierra apretando y si ejercemos presión en la parte anterior de la planta del pie flexiona con fuerza los dedos. Probablemente sea una reminiscencia de los pies prensiles de los simios. Suele desaparecer hacia los cinco o seis meses.

Succión

Reflejo de succión: es imprescindible para que pueda alimentarse y ejerce también un efecto tranquilizador. Succionará cualquier cosa al alcance de su boca (pezón, tetina, mano, dedo, chupete). Hacia el sexto mes suele convertirse ya en un acto voluntario.



Babinski

El reflejo de Babinski se presenta después de que se ha frotado firmemente la planta del pie. El dedo gordo del pie entonces se mueve hacia arriba o hacia la superficie superior del pie. Los otros dedos se abren en abanico.



BIBLIOGRAFIA:

STANFORD MEDICINE CHILDREN'S HEALTH. (S. F.).
[HTTPS://WWW.STANFORDCHILDRENS.ORG/ES/TOPIC/DEFAULT?ID=NEWBORN-REFLEXES-90-P05741](https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=newborn-reflexes-90-p05741)