

# MUERTE MATERNA

Docente: Dr. Yasuei Nakamura Hernandez  
Materia: Diseño Experimental  
Alumna: Rosario Lara Vega





# Muerte Materna

Una defunción que ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio, es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción (obstétrica y no obstétrica).



Los factores que generan riesgo para el embarazo se pueden dividir en cuatro categorías:

**01**

Edad

**02**

Condiciones en el embarazo

**03**

Factores del estilo de vida

**04**

Problemas de salud existentes





## **Morbilidad materna**

Complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio que pone en riesgo la vida de la mujer o requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la muerte

## **Mortalidad materna**

Defunción que ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio, es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días

## + Morbilidad materna

- Problemas cardiovasculares
- Problemas en los vasos sanguíneos;
- Diabetes;
- Hipertensión arterial;
- Infecciones, especialmente por cesárea;
- Hemorragia
- Anemia
- Náuseas y vómitos (a veces, llamados malestares matutinos) e hiperémesis gravídica (malestares matutinos severos)
- Depresión y ansiedad.

## + Mortalidad materna

- Hemorragia
- Infecciones y sepsis
- Preeclampsia y eclampsia
- Complicaciones del trabajo de parto
- Aborto



# Datos & Cifras

- **En 2020, cada día murieron casi 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto.**
- **En 2020, se produjo una muerte materna prácticamente cada dos minutos.**
- **Entre 2000 y 2020, la razón de mortalidad materna (es decir, el número de muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos) se redujo a escala mundial en un 34%, aproximadamente.**
- **En 2020, prácticamente el 95% de todas las muertes maternas se dieron en países de ingresos bajos y medianos bajos.**
- **La atención a cargo de profesionales de la salud capacitados antes, durante y después del parto puede salvar la vida de la madre y del recién nacido.**

# Datos & Cifras

+

- **Todos los días, aproximadamente 830 mujeres mueren por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto en todo el mundo.**
- **El 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo.**
- **La mortalidad materna es más alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en las comunidades más pobres.**
- **En comparación con otras mujeres, las adolescentes enfrentan un mayor riesgo de complicaciones y muerte como resultado del embarazo.**
- **La atención antes, durante y después del parto puede salvar la vida de las mujeres y los recién nacidos.**
- **Entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en todo el mundo disminuyó en un 44%.**
- **Entre 2016 y 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo es reducir la tasa global de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.**

+

+

+

# Embarazo en Adolescentes

- + El embarazo en la adolescencia es un fenómeno mundial con causas claramente conocidas y graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

**El embarazo adolescente puede ocurrir por múltiples razones, algunas de ellas son:**

- Abuso, violación o explotación sexual.
- Inequidades en educación con mayor nivel de desescolarización.
- Mayores niveles de pobreza, condición de desplazamiento o situaciones de conflicto.
- Inicio temprano de las relaciones sexuales.
- Influencia de los medios de comunicación.
- Decisión voluntaria y consciente de quedar en embarazo o relaciones desprotegidas.

+



- + El embarazo en la adolescencia es un fenómeno mundial con causas claramente conocidas y graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas tanto para las personas afectadas como para sus familias y comunidades.

Los embarazos precoces también tienen un impacto negativo tanto en la salud física de la madre como en la del bebé que está en camino: malnutrición, partos prematuros, niños con problemas de desarrollo o malformaciones e incluso un **50%** de probabilidades de perder la vida durante las primeras semanas. Como si fuera poco, las **madres adolescentes** también están expuestas:

- **Falta de atención médica por desconocimiento o por porque no tienen acceso.**
- **Riesgos de padecer distintas enfermedades ginecológicas como preeclampsia o eclampsia.**
- **Altos índices de mortalidad.**
- **Complicaciones como consecuencia de abortos clandestinos.**
- **Enfermedades de transmisión sexual.**



+

- +  Los principales factores de riesgos asociados con el embarazo adolescente están relacionados con el inicio precoz de las relaciones sexuales, la deficiente educación sexual y los conflictos con la familia.
- Las complicaciones más significativas asociadas a gestantes adolescentes son la enfermedad hipertensiva gestacional, los traumas obstétricos del parto, el recién nacido pretérmino y el bajo peso. +
- La prevención de los factores de riesgos, desarrollar una correcta educación sexual por la familia, la sociedad y los profesionales de la salud, favorecerá a la disminución de los embarazos en edades tempranas.



# Datos & Cifras

- En 2019, se calcula que las adolescentes de entre 15 y 19 años de los países de ingreso mediano bajo tenían 21 millones de embarazos al año, de los cuales aproximadamente el 50% eran no deseados.
- Se calcula que en 2016 se produjeron 21 millones de embarazos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años en las regiones en desarrollo, de los que se estima que 12 millones dieron lugar a nacimientos.
- Según los datos de 2019, el 55% de los embarazos no deseados entre las adolescentes de 15 a 19 años terminan en abortos, que a menudo no son seguros en los países de ingreso mediano bajo.
- Las madres adolescentes (de 10 a 19 años) tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años, y los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave.
- La prevención del embarazo entre las adolescentes y la mortalidad y morbilidad relacionadas con el embarazo son fundamentales para lograr resultados positivos en la salud a lo largo de la vida, y son imprescindibles para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud materna y neonatal.

# Prevención & Promoción

+

- Control prenatal
- Educación Sexual
- Fortalecer los servicios diferenciados de salud integral de adolescentes.
- Suministrar de manera gratuita métodos anticonceptivos modernos y garantizar la distribución del anticonceptivo oral de emergencia.
- Aplicar un marco de derechos humanos para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la buena calidad de la atención de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal a todas las personas que la necesiten
- Garantizar cobertura universal de salud para una atención integral a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal

+

+

+