



Universidad del sureste



Campus Comitán

Medicina Humana

Xóchitl Monserrath Jiménez del Agua y Culebro.

Investigación Epidemiológica Avanzada

4°

“A”

Dr. Yasuei Nakamura Hernández.

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de diciembre de 2023

Zika



Entre las décadas de 1960 y 1980 se detectaron infecciones humanas esporádicas en África y Asia. Sin embargo, desde 2007 se han registrado brotes de enfermedad por el virus de Zika en África, las Américas, Asia y el Pacífico.

En los brotes registrados en el último decenio, la infección por el virus de Zika se ha asociado a una mayor incidencia del síndrome de Guillain-Barré.

Clinica

- Más asintomática
 - Erupciones cutáneas
 - Fiebre
 - Conjuntivitis
 - Mialgias y artralgias
 - Malestar general y cefaleas
- Duran entre 2 y 7 días.

Y



Complicaciones

Durante el embarazo puede causar:

- microcefalia
- Partos prematuros
- Abortos espontáneos.


La infección se asocia en niños y adultos a un aumento del riesgo de complicaciones neurológicas, como:

- Sx de Guillain-Barré, la neuropatía y la mielitis.



transmisión

- picadura de mosquitos en las regiones tropicales y subtropicales.
- Los mosquitos Aedes suelen picar durante el día
- De la madre al feto durante el embarazo, así como
- Por contacto sexual
- Transfusiones de sangre y productos sanguíneos
- Trasplantes de órganos.



Más zika en México

- 2021 notificados 27 casos en Morelos y uno en Sinaloa.
- 2022 Morelos tuvo 9 casos, Oaxaca 9 casos, Veracruz 1 y Quintana Roo también 1.
- El país experimenta casos del virus desde el Enero de 2016.



Diagnostico

- Clínica
- BH
- diferenciarse de la infección por flavivirus afines

Tratamiento

- No existe tx
- Antipiréticos analgésicos.
- Evitarse AINES



BIBLIOGRAFÍA

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022). Virus de zika.