



Mi Universidad

Infografía

Jorge Daniel Hernández González

Infografía

Parcial: 3°

Psiquiatría

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Licenciatura de Medicina Humana

Semestre: 5to., Grupo: C

Comitán de Domínguez, Chiapas. A 11 de noviembre del 2023.

“TRANSTORNOS DE ANSIEDAD”

Prevalencia y Edad de Inicio.

- Se presenta más en hombres
- Edad promedio de inicio entre los dieciocho y treinta años de edad.
- Se ha descubierto que cuanto más joven es una persona que empieza a beber o a consumir drogas, más probable es que se convierta en adicto/a en la edad adulta.

Síntomas Característicos.

- La dependencia
- La tolerancia
- La abstinencia.

Los comportamientos compulsivos de consumo de drogas incluyen el uso incontrolado de la droga, el deseo de consumirla, las cantidades excesivas de tiempo dedicadas a obtenerla.



Tipos de Trastornos Relacionados con las Sustancias.

Alcohol, Cafeína, Cannabis (Marihuana), Alucinógenos (por ejemplo, LSD), Inhalantes (por ejemplo, diluyente de pintura), Opiáceos (por ejemplo, heroína), Sedantes, sustancias hipnóticas y ansiolíticas (por ejemplo, Valium, barbitúricos, pastillas para dormir), Estimulantes, Tabaco y Otras sustancias.

Recaída

El consumo repetido de drogas puede causar cambios en el cerebro que pueden afectar el autocontrol de una persona adicta y su capacidad para resistir los antojos. La prevención de la recaída de las drogas es una parte esencial del proceso de recuperación porque las personas permanecen en un mayor riesgo durante muchos años.



Tratamientos y Apoyo.

- Desintoxicación
- Psicoterapia
- Prevención de recaídas
- Farmacoterapia

