



Mi Universidad

infografía

Andrea Díaz Santiago

Infografía de trastorno psiquiátrico

2° parcial

Psiquiatría

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Medicina Humana

5°C

Comitán de Domínguez a 12 de octubre de 2023.

TRASTORNO DEL ESQUIZOFRENIFORME

Gabriel Langfeldt, empleó el término esquizofreniforme en 1939 para describir una enfermedad de inicio súbito y evolución benigna asociada a síntomas del estado de ánimo y obnubilación.



EPIDEMIOLOGÍA

- Más común en adolescentes y adultos jóvenes
- 5 veces mayor en hombres que en mujeres



ETIOLOGÍA

- Las causas externas hasta el momento son desconocidas
- La genética
- La química cerebral
- Ambiental
- Abuso de sustancias



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



TRASTORNO ESQUIZOFRÉNICO

Difieren principalmente en términos de la duración de la enfermedad > 1 mes pero < a 6 meses



TRASTORNO PSICÓTICO BREVE

La duración de este es de <1 mes
Trastorno bipolar
Depresión
Trastorno delirante
Trastorno de estrés post-traumático
Lesión cerebral



SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALERTA



Delirios



Alucinaciones



Discurso desorganizado



Comportamiento motor desorganizado



Tener "aplanamiento afectivo" (esto es falta de emoción en expresiones faciales o tono de voz.)



Sentido de placer reducido al hacer actividades de todos los días



Dificultad en empezar y sostener actividades



Habla reducida

DIAGNÓSTICO

Exploración física: Se hace para ayudar a descartar otros problemas

Pruebas y exámenes de detección: exámenes que ayudan a descartar afecciones con síntomas similares y exámenes de detección de alcohol y drogas

Evaluación psiquiátrica: observa la apariencia y el comportamiento y pregunta sobre pensamientos, estados de ánimo, delirios, alucinaciones, uso de sustancias y la posibilidad de suicidio

Criterios diagnósticos para el trastorno esquizoafectivo: utilizar los criterios de DSM-5



TRATAMIENTO

- **Antipsicóticos:**
 - específicamente para tratar el trastorno esquizoafectivo es el antipsicótico paliperidona
- **Medicamentos para estabilizar el estado de ánimo:**
 - Cuando el trastorno esquizoafectivo es del tipo bipolar, los estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudar a nivelar el estado eufórico y la depresión
- **Antidepresivos:**
 - Cuando la depresión es el trastorno anímico oculto, los antidepresivos pueden ayudar a controlar los sentimientos de tristeza, desesperanza o dificultad para dormir y concentrarse
- **Psicoterapia**
- **Entrenamientos**



Bibliografía

American Psychiatric Association - APA. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (5a. ed. --.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.