



Mi Universidad

infografía

Joseph Eduardo Córdova Ramirez

3er parcial

Psiquiatría

Infografía de trastorno psiquiátrico

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitan de Domínguez 11 de noviembre de

2023

Trastornos disociativos

1. Definición.

El fenómeno disociativo es específicamente amnésico en el sentido de que el paciente no puede evocar un recuerdo importante, por lo general traumático o estresante, pero conserva la capacidad de aprender nuevas cosas.



2. Síntomas

- Amnesia
- Sensación de estar separado de el mismo y de sus emociones
- Mucho estrés o problemas en sus relaciones personales
- Sentido confuso de la identidad
- Problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y pensamientos y conductas suicidas



3. Diagnóstico diferencial

1. Demencia o delirio. La amnesia se asocia con muchos síntomas cognitivos. 2. Epilepsia. El deterioro repentino de la memoria asociado con anomalías motrices o en el electroencefalograma (EEG). 3. Amnesia global transitoria. Asociada con amnesia anterógrada durante el episodio; los pacientes tienden a estar más molestos y preocupados por los síntomas, además de ser capaces de retener su identidad personal. La pérdida de memoria se generaliza y los acontecimientos remotos se recuerdan mejor que los recientes.



4. Etiología y psicodinámica

1. Trauma emocional precipitante.
2. Abuso físico y sexual.

1. Las defensas incluyen la represión, la negación y la disociación.
2. La pérdida de la memoria es secundaria al conflicto psicológico doloroso.

Tratamiento

1. Psicológico. Ayuda a los pacientes a incorporar los recuerdos en su estado consciente. La hipnosis se utiliza sobre todo como un medio para relajar al paciente lo suficiente como para recordar información olvidada.
2. Farmacológico. Las entrevistas asistidas por fármacos, como barbitúricos de acción corta (tiopental y amobarbital sódico administrado por vía intravenosa), así como las benzodiazepinas, pueden emplearse para ayudar a los pacientes a recuperar los recuerdos olvidados.

