



Infografía

Derlin Guadalupe Castillo González

Trastornos disociativos

3er parcial

Psiquiatría

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Licenciatura en medicina humana

5to semestre



Trastornos Disociativos

¿Que es?

El fenómeno disociativo es específicamente amnésico en el sentido de que el paciente no puede evocar un recuerdo importante, por lo general traumático o estresante, pero conserva la capacidad de aprender nuevas cosas.

El trastorno no es resultado de una afección médica general, ni se relaciona con el consumo de drogas. Son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad.



Tipos de amnesia disociativa

- Amnesia localizada
- Amnesia selectiva
- Amnesia generalizada
- Amnesia continua
- Amnesia sistematizada



Epidemiología

- Trastorno disociativo más frecuente (2-6%)
- Más habitual en mujeres
- Más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes que en adultos mayores
- Aumento de la incidencia durante las épocas de guerra y de catástrofes naturales

Etiología

- Trauma emocional precipitante
- Abuso físico y sexual
- Descartar causas orgánicas



Diagnóstico diferencial

- Demencia o delirio.
- Epilepsia.
- Amnesia global transitoria.

Psicodinámica

- Las defensas incluyen la represión, la negación y la disociación.
- La pérdida de la memoria es secundaria al conflicto psicológico doloroso.

Signos y síntomas de la amnesia disociativa

- Incapacidad para recordar información personal (a menudo de experiencias estresantes) más traumática que el olvido.
- Puede ocurrir con o sin fuga disociativa (vagabundeo).



Tratamiento

- Psicológico: Ayuda a los pacientes a incorporar los recuerdos en su estado consciente.
- Farmacológico: Los barbitúricos de acción corta, así como las benzodiazepinas, ayuda a los pacientes a recuperar los recuerdos olvidados.

Bibliografía

Manual de Bolsillo de Psiquiatría Clínica
6°ed Kaplan & Sadock.

[Trastornos disociativos](#)